

Peppler-Lisbach & Könitz: Vegetationsveränderungen in Borstgrasrasen des Werra-Meißner-Gebietes

Anhang E3. Differenzen von Artenzahlen (a) und Gruppenmengen (b) der Artengruppen 1986/87-2012. *P*-Wert: Ergebnisse des Wilcoxon-Paarvergleichstests.

Supplement E3. Differences in species richness (a) and cover sums (b) of species groups 1986/87-2012. *P*-Wert: *P*-value of Wilcoxon test.

a) Artenzahlen	Minimum	Maximum	Mittel	Median	<i>P</i> -Wert	n
Artenzahl gesamt	-13,00	21,00	0,47	0,50	0,651	60
Kennarten	-9,00	5,00	-1,45	-1,00	0,000	60
Magerkeitszeiger	-14,00	6,00	-1,17	-1,00	0,005	60
Grünlandarten	-7,00	11,00	1,50	1,00	0,000	60
Verbrachungszeiger	-3,00	9,00	0,95	1,00	0,000	60
b) Gruppenmengen	Minimum	Maximum	Mittel	Median	p-Wert	n
Kennarten	-24,90	14,93	-3,45	-3,69	0,003	60
Magerkeitszeiger	-24,63	10,99	-0,96	-0,64	0,278	60
Grünlandarten	-11,49	19,48	3,82	3,61	0,000	60
Verbrachungszeiger	-4,56	17,33	1,67	1,00	0,000	60