

Pseudodifferentialoperatoren

(Teil-)Skript zur Vorlesung Partielle Differentialgleichungen II, WS 2012/13

D. Grieser*

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
III.0 Der Schwartzsche Kernsatz	3
Lineare Algebra und Integraloperatoren	3
Beispiele für Integraloperatoren und ihre Integralkerne	4
Definition von Integraloperatoren, deren Kerne Distributionen sind	4
Der Schwartzsche Kernsatz	5
Träger-Eigenschaften von Integraloperatoren	5
Glättende Operatoren	7
Adjungierte, Komposition	8
III.1 ΨDOs, Grundidee	8
III.2 Symbole	10
Fouriertransformation von Symbolen	11
III.3 ΨDOs: Definition, Schwartz Kern und Abbildungseigenschaften	12
Beweise: Die zentralen Punkte	14
Beweise: Wie man divergente Integrale konvergent macht	14
III.4 Asymptotische Summation	17
III.5 Restterme	18
III.6 Reduktion, Symbol eines ΨDOs	19
Der Fall von Differentialoperatoren	19
Der Reduktionssatz	19
Bedeutung des Symbols	21
Formel für das Symbol des adjungierten Operators	21
Links- und Rechtssymbol	22
III.7 Komposition von ΨDOs	22
Eigentlich getragene Operatoren	22
Die Kompositionsformel	23
III.8 Hauptsymbol, klassische Operatoren	26
III.9 Die Parametrixkonstruktion für elliptische Operatoren	27
Die algebraische Struktur hinter der Parametrixkonstruktion	29
III.10 ΨDOs auf Sobolevräumen	31

*Stand: 14. Februar 2013. Vielen Dank an Markus Dafinger für Hilfe beim Erstellen des Skripts.

III.11 Elliptische Regularität	33
III.12 Transformation von ΨDOs unter Koordinatentransformation	34
III.13 ΨDOs auf Mannigfaltigkeiten	36
Grundzüge der Analysis auf Mannigfaltigkeiten	36
Die wichtigsten Sätze über Ψ DOs auf kompakten Mannigfaltigkeiten	38
Beispiele von Differentialoperatoren und Ψ DOs auf Mannigfaltigkeiten	39
III.14 Überblick über den Pseudodifferentialkalkül	40
Das Wichtigste in Kürze	40
Operatoren – Symbole – Kerne	40
Einige Details zur technischen Durchführung	41
Varianten, Ausblick	41
Der gleichmäßige Ψ DO-Kalkül auf \mathbb{R}^n	42

Einleitung

Pseudodifferentialoperatoren sind ein Kernstück der modernen Theorie der Partiellen Differentialgleichungen. Sie wurden in den 1960 Jahren erfunden. Die Klasse der Pseudodifferentialoperatoren enthält sowohl (lineare, partielle) Differentialoperatoren als auch die Lösungsoperatoren für elliptische Gleichungen. Damit bilden sie eine gemeinsame Verallgemeinerung von Differential- und (gewissen) Integraloperatoren. Sie erlauben, detaillierte Informationen über Lösungen partieller Differentialgleichungen (auch nicht-elliptische) herzuleiten, auch wenn die Gleichung nicht explizit lösbar ist (was meistens der Fall ist).

Den Bereich der Konzepte und Ideen um Ψ DOs nennt man auch *mikrolokale Analysis*.

Zu Pseudodifferentialoperatoren gibt es einige einführende Literatur, z.B.:

- M. Shubin, Pseudodifferential Operators and Spectral Theory (Springer, 1987)
- G. Folland, Introduction to Partial Differential Equations; 2nd edition, letztes Kapitel (Princeton University Press, 1995)
- H. Abels, Pseudodifferential and Singular Integral Operators (de Gruyter, 2011)
- A. Grigis und J. Sjöstrand, Microlocal Analysis for Differential Operators (Cambridge University Press, 1994)
- L. Hörmander, The Analysis of Partial Differential Operators III (Springer, 1985)

Von diesen finde ich Shubin am klarsten aufgebaut. Hörmander ist enzyklopädisch und für einen ersten Einstieg ungeeignet. Allerdings hat jede Darstellung ihre Eigenheiten, z.B. werden in Shubin zunächst allgemeinere oszillierende Integrale als die hier benötigten behandelt, was interessant (und für die allgemeineren Fourierintegraloperatoren wichtig), aber für einen ersten Einstieg unnötig kompliziert ist.

Daher dieses Skript. Ziel ist es, die Grundzüge der Theorie auf möglichst kurzem Weg darzustellen und dabei den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Dazu gehört folgendes:

- Ψ DOs verallgemeinern Differentialoperatoren, enthalten auch Lösungsoperatoren für elliptische Gleichungen.
- Ψ DOs sind durch Integralkerne gegeben, deren Singularität auf der Diagonalen liegt.
- Die Singularität auf der Diagonalen wird durch das Symbol des Ψ DOs beschrieben.
- Die Aussagekraft des Ψ DO-Kalküls liegt in der Beschreibung dieser Singularität; daher ist es sinnvoll, Ψ DOs modulo glättenden Operatoren zu betrachten.
- Adjungierte und Komposition von Ψ DOs sind wieder Ψ DOs (kleine Zusatzbedingung bei Komposition), und deren Symbole lassen sich im Wesentlichen explizit berechnen.
- Die Parametrix-Konstruktion für elliptische Operatoren, und dass man hierfür nur die kurze exakte Symbolsequenz für Ψ DOs braucht.
- Einige Anwendungen, z.B. elliptische Regularität

Einige Details, die eher Nebenschauplätze sind, aber die technische Durchführung gelegentlich verkomplizieren, sind:

- Für den Beweis der Kompositionsformel ist es sinnvoll, Ψ DOs zunächst allgemeiner durch Amplituden einzuführen (Funktionen von x, y, ξ) statt durch ihre Symbole (Funktionen von x, ξ).
- Für die Komposition muss man eigentlich getragene Operatoren betrachten.

Es gibt zahlreiche ‚Spielarten‘ für Ψ DOs. Wir betrachten hier die lokale Theorie, bei der man annimmt, dass die Symbolabschätzungen nur lokal gleichmäßig (bzgl. x) gelten. Diese eignet sich als Einstieg, da man sich keine Gedanken über das Verhalten ‚am Rand‘ ($x \rightarrow \partial\Omega$ oder $x \rightarrow \infty$ für $\Omega = \mathbb{R}^n$) machen muss.

Es gibt zahlreiche andere Ψ DO-Kalküle, bei denen zusätzlich Bedingungen an das Verhalten gestellt werden, wenn sich x dem Rand nähert. Z.B. auf \mathbb{R}^n dass die Abschätzungen gleichmäßig in x gelten, siehe z.B. das Buch von Abels. Diese sind ebenfalls sehr wichtig, aber neben der Singularität bei der Diagonale spielen hier gleichzeitig andere Kern-Eigenschaften eine Rolle. Diese Kalküle kann man wie aus einem Baukastensystem aus einzelnen Teilen zusammensetzen, und der hier behandelte lokale Kalkül ist der zentrale Baustein, auf dem alles andere aufbaut.

III.0 Der Schwartzsche Kernsatz

Aus der linearen Algebra ist bekannt, dass jede lineare Abbildung zwischen endlich-dimensionalen Vektorräumen als Matrix dargestellt werden kann. Der Schwartzsche Kernsatz verallgemeinert dies auf eine große Klasse von Operatoren zwischen Funktionen- bzw. Distributionenräumen. Kurz gesagt, ist seine erstaunliche Aussage:

Jeder ‚vernünftige‘ Operator ist ein Integraloperator.

Um dies mit Sinn zu füllen, müssen wir sagen, was ein vernünftiger Operator und was ein Integraloperator ist.

Lineare Algebra und Integraloperatoren

Erinnern wir uns zunächst an den endlich-dimensionalen Fall: Eine beliebige lineare Abbildung $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ kann durch eine $m \times n$ Matrix $K = (K_{ij})_{i=1, \dots, m, j=1, \dots, n}$ dargestellt werden. Dabei ist die Relation zwischen P und K wie folgt gegeben. Ist $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$, so ist die i -te Komponente von $Pu \in \mathbb{R}^m$ gleich

$$(Pu)_i = \sum_{j=1}^n K_{ij} u_j, \quad i \in \{1, \dots, m\} \quad (1)$$

Dies hat eine unmittelbare Verallgemeinerung im Rahmen der Maßtheorie: Seien (M, \mathcal{A}, μ) , (M', \mathcal{A}', μ') Maßräume und $K : M \times M' \rightarrow \mathbb{C}$ messbar, dann definiert

$$(Pu)(x) = \int_{M'} K(x, x') u(x') d\mu'(x') \quad \text{für } x \in M \quad (2)$$

einen Operator, der (messbare) Funktionen u auf M' in Funktionen Pu auf M abbildet.¹ Wir nennen P *Integraloperator* mit *Integralkern* K und schreiben manchmal $P = P_K$.

Die Formeln (1) und (2) sind formal sehr ähnlich: Ersetze i durch x , j durch x' und die Summe durch das Integral, und schreibe bei u , Pu und K Argumente statt Indices. Diese Ähnlichkeit kommt daher, dass (1) ein Spezialfall von (2) ist: Setze $M = \{1, \dots, m\}$, $M' = \{1, \dots, n\}$, μ, μ' Zählmaße.

Die aus der linearen Algebra zitierte Tatsache lässt sich also so umformulieren: Für endliche M, M' sind die linearen Abbildungen von Funktionen auf M' nach Funktionen auf M genau die Integraloperatoren.

¹Auf welchen u dies definiert ist – d.h. das Integral konvergiert – und was für Funktionen Pu herauskommen, hängt von den Eigenschaften von K ab. Dies ist hier zunächst unwichtig. Trotzdem zwei Beispiele: Ist $K \in L^\infty(M \times M', \mu \times \mu')$, so bildet $P_K : L^1(M', \mu') \rightarrow L^\infty(M, \mu)$ ab. Ist $K \in L^2(M \times M', \mu \times \mu')$, so bildet $P_K : L^2(M', \mu') \rightarrow L^2(M, \mu)$ ab.

Der Schwartzsche Kernsatz verallgemeinert dies auf den Fall, wo M, M' offene Teilmengen von \mathbb{R}^n sind, allerdings muss man dann nur geeignete Funktionen/Distributionen betrachten, nur stetige lineare Abbildungen betrachten und als Kerne Distributionen zulassen.

Dies ist zunächst überraschend, da auf diese Weise auch Differentialoperatoren als Integraloperatoren geschrieben werden können!

Beispiele für Integraloperatoren und ihre Integralkerne

- Sei E eine Funktion auf \mathbb{R}^n . Die Faltung

$$(Pu)(x) = (E * u)(x) = \int E(x - x')u(x')dx'$$

ist ein Integraloperator mit Integralkern $K(x, x') = E(x - x')$.² Z.B. ist eine Lösung der Laplace-Gleichung durch einen Faltungsoperator gegeben: Sei

$$N(x) = \begin{cases} c_2 \log |x|, & n = 2 \\ c_n |x|^{2-n}, & n > 2 \end{cases} \quad (3)$$

mit geeigneten Konstanten c_n . Dann ist $u = N * f$ für $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ definiert und eine Lösung der Gleichung $\Delta u = f$ auf \mathbb{R}^n .

- Die identische Abbildung $\text{Id} : C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. Sei $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. Aus der formalen Rechnung

$$u(x) = \langle \delta_x, u \rangle = \int \delta(x' - x)u(x') dx' = \int \delta(x - x')u(x') dx' \quad (4)$$

folgt $\text{Id} = P_K$ mit $K(x, x') = \delta(x - x')$. Die genaue Bedeutung dieses formalen Integrals wird unten erklärt.

- Lineare Differentialoperatoren P . Leitet man (4) nach x_j ab und rechnet formal, erhält man

$$\partial_{x_j} u(x) = \int \partial_{x_j} \delta(x - x')u(x')dx', \quad (5)$$

also $\hat{\partial}_{x_j} = P_{\partial_{x_j} \delta(x-x')}$, und allgemeiner

$$\sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D_x^\alpha u(x) = \int \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D_x^\alpha \delta(x - x')u(x')dx' \quad (6)$$

also

$$P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D_x^\alpha \text{ hat Integralkern } K(x, x') = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D_x^\alpha \delta(x - x'). \quad (7)$$

Definition von Integraloperatoren, deren Kerne Distributionen sind

Die Beispiele zeigen, dass wir Differentialoperatoren als Integraloperatoren schreiben können, wenn wir Distributionen als Integralkerne zulassen. Daher sollten wir zunächst die Definition (2) auf den Fall erweitern, dass K eine Distribution ist. Hierbei sind immer $M = \Omega, M' = \Omega'$ Gebiete in \mathbb{R}^n bzw. \mathbb{R}^m und $d\mu, d\mu'$ Lebesgue-Maß.

Um zu einer Definition für Distributionen K zu gelangen, rechnen wir zunächst im Falle einer Funktion $K \in L_{loc}^1(\Omega \times \Omega')$ und für $\psi \in C_0^\infty(\Omega'), \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$

$$\begin{aligned} \langle P_K \psi, \varphi \rangle_\Omega &= \int_\Omega (P_K \psi)(x) \varphi(x) dx = \int_\Omega \int_{\Omega'} K(x, x') \underbrace{\psi(x') \varphi(x)}_{= \varphi(x) \psi(x')} dx' dx = \\ &= \langle K, \varphi \otimes \psi \rangle_{\Omega \times \Omega'}, \end{aligned}$$

wobei $(\varphi \otimes \psi)(x, x') := \varphi(x) \psi(x')$ das *Tensorprodukt* ist.

²Wiederum hängt Definitions- und Wertebereich von P von den Eigenschaften von E ab.

Daher definieren wir für $K \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega')$ den Operator $P_K : C_0^\infty(\Omega') \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ durch

$$\langle P_K \psi, \varphi \rangle_\Omega := \langle K, \varphi \otimes \psi \rangle_{\Omega \times \Omega'} \quad \forall \psi, \varphi. \quad (8)$$

Man sollte noch nachprüfen, dass das so definierte Funktional $P_K \psi$ tatsächlich eine Distribution auf Ω ist. Linearität ist klar, und Stetigkeit überlasse ich Ihnen als Übung.

K heißt wieder Integralkern von P_K , oder Schwartz Kern, oder einfach Kern (nicht zu verwechseln mit dem Kern im Sinne der Menge $\{u : P_K u = 0\}$).

Der Schwartzsche Kernsatz

Oben wurde zu jedem Kern $K \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega')$ ein Operator $P_K : C_0^\infty(\Omega') \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ definiert. Der Schwartzsche Kernsatz sagt, dass jeder Operator auf diese Weise entsteht, sofern man zusätzlich Stetigkeit fordert. Genauer:

Satz 1.

a) Für jedes $K \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega')$ definiert (8) einen stetigen linearen Operator

$$P_K : C_0^\infty(\Omega') \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$$

b) Umgekehrt gibt es für jeden stetigen linearen Operator $P : C_0^\infty(\Omega') \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ genau ein $K \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega')$ mit $P = P_K$.

Mit anderen Worten: Die durch (8) definierte Zuordnung $K \mapsto P_K$ definiert eine Bijektion

$$\mathcal{D}'(\Omega \times \Omega') \rightarrow \{\text{stetige lineare Operatoren } C_0^\infty(\Omega') \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)\}$$

Bei a) ist nur noch die Stetigkeit von P_K zu zeigen, das ist nicht schwierig. Der Beweis von b) ist schwieriger. Der Beweis von Satz 1 ist in [Hörmander, The Analysis of Linear Partial Differential Operators 1] zu finden.

Im Folgenden werden wir untersuchen, wie Eigenschaften von K mit Abbildungseigenschaften von P_K korrelieren.

Träger-Eigenschaften von Integraloperatoren

Wir schreiben auch für Distributionen formal

$$(P_K \psi)(x) = \int K(x, x') \psi(x') dx'$$

statt (8). Was kann man aus $\text{supp } K$ und $\text{supp } \psi$ über $\text{supp } P_K \psi$ schließen? Hierfür benötigen wir eine Definition.

Definition 2. Sei $R \subset \Omega \times \Omega'$ und $M \subset \Omega$. Dann sei

$$R \circ M := \{x : \exists x' \text{ mit } (x, x') \in R, x' \in M\}$$

Das heißt, $R \circ M$ besteht aus den x , die man durch 'Anwenden' der Relation R auf beliebige Elemente von M erhält.

Satz 3.

a) $\text{supp } P_K \psi \subset \text{supp } K \circ \text{supp } \psi$

b) Falls P_K eine stetige Fortsetzung $P_K : \mathcal{E}'(\Omega') \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ hat, so gilt für $\psi \in \mathcal{E}'(\Omega')$

$$\text{sing supp } P_K \psi \subset \text{sing supp } K \circ \text{sing supp } \psi$$

Dies verallgemeinert unmittelbar ähnliche Aussagen über Faltungen. Diese ergeben sich als Spezialfall, wo $\Omega = \Omega' = \mathbb{R}^n$ und K die Form $K(x, x') = E(x - x')$ hat. Dann ist $\text{supp } K \circ \text{supp } \psi = \text{supp } E + \text{supp } \psi$. Der Beweis des Satzes läuft ähnlich wie in diesem Spezialfall (Übung). Zur Frage, wann P_K eine Fortsetzung wie in b) hat, siehe auch (13).

Ab jetzt betrachten wir nur den Fall $\Omega = \Omega'$. Folgende Menge spielt eine zentrale Rolle.

Definition 4. Die **Diagonale** von $\Omega \times \Omega$ ist $\text{Diag}_\Omega := \{(x, x), x \in \Omega\}$

Beachte, dass Diag_Ω als Relation die Identität ist, d.h. $\text{Diag}_\Omega \circ M = M$ für alle M .

Beispiel (Differentialoperatoren): Sei $P = P(x, D_x)$ ein Differentialoperator. Nach (7) ist $P = P_K$ mit $K = P(x, D_x)\delta(x - x')$. Also ist

$$\text{supp } K = \text{sing supp } K \subset \text{Diag}_\Omega.$$

Aus Satz 3 folgt dann:

- a) $\text{supp } P\psi \subset \text{Diag}_\Omega \circ \text{supp } \psi = \text{supp } \psi$
- b) $\text{sing supp } P\psi \subset \text{Diag}_\Omega \circ \text{sing supp } \psi = \text{sing supp } \psi$.

Beides können wir direkt einsehen: Ein Differentialoperator kann weder Träger noch singulären Träger einer Distribution vergrößern. Denn ist die Distribution ψ auf einer offenen Menge gleich Null (bzw. glatt), so ist $P\psi$ auf derselben Menge ebenfalls gleich Null (bzw. glatt).

Das Beispiel motiviert folgende Begriffe.

Definition 5.

- a) $P : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ heißt **lokal** $\Leftrightarrow \text{supp } P\psi \subset \text{supp } \psi, \forall \psi$
- b) $P : \mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ heißt **pseudolokal** $\Leftrightarrow \text{sing supp } P\psi \subset \text{sing supp } \psi, \forall \psi$

Satz 6. Sei $K \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$. Dann sind äquivalent:

- i) P_K ist lokal
- ii) $\text{supp } K \subset \text{Diag}_\Omega$

Beweis: i) \Rightarrow ii): Um ii) zu zeigen, genügt es, für beliebige 'Rechtecke' $U \times U' \subset \Omega \times \Omega$ mit $U, U' \subset \Omega$ offen und $U \cap U' = \emptyset$ zu zeigen, dass $K|_{U \times U'} = 0$ ist. Denn $\Omega \times \Omega \setminus \text{Diag}_\Omega$ ist die Vereinigung aller dieser Rechtecke.

Nun ist $K|_{U \times U'}$ nichts Anderes als der Integrkern des Operators $C_0^\infty(U') \rightarrow \mathcal{D}'(U)$, der durch die Hintereinanderausführung der Abbildungen $C_0^\infty(U') \hookrightarrow C_0^\infty(\Omega) \xrightarrow{P_K} \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(U)$ gegeben ist (wobei die erste Abbildung als Fortsetzung durch Null und die letzte als Einschränkung auf U definiert ist). i) sagt, dass dieser Operator gleich Null ist. Also muss sein Integrkern gleich Null sein, also $K|_{U \times U'} = 0$.

ii) \Rightarrow i): Dies folgt direkt aus Satz 3 a) (siehe auch obiges Beispiel). \square

Satz 7. Sei $\text{supp } K \subset \text{Diag}_\Omega$ und K habe endliche Ordnung. Dann ist P_K ein Differentialoperator.

Beweis: (Skizze) Wenn $\text{supp } K \subset \text{Diag}_\Omega$, dann muss K eine Linearkombination mit glatten Koeffizienten und Ableitungen von $\delta_{\text{Diag}_\Omega} = \delta(x - x')$ sein. Dies verallgemeinert den Satz, dass eine Distribution K mit $\text{supp } K \subset \{0\}$ eine Linearkombination von Ableitungen von δ sein muss, und lässt sich ähnlich beweisen. Siehe Satz 2.3.5 in Hörmander (Band I). \square

Kombiniert man die Aussagen von Satz 6 und Satz 7 und betrachtet man das Beispiel der Differentialoperatoren, dann folgt:

$$P_K \text{ lokal und } K \text{ endlicher Ordnung} \Leftrightarrow P_K \text{ ist ein Differentialoperator.}$$

Nun wollen wir uns ein Beispiel eines pseudolokalen Operators ansehen. Im \mathbb{R}^3 ist $\frac{c}{|x|}$ eine Fundamentallösung des Laplace-Operators, d.h. der Faltungoperator

$$(P_K u)(x) = \int \frac{c}{|x - x'|} u(x') dx' \tag{9}$$

ist ein Lösungsoperator für die Laplace-Gleichung. Dieser Operator ist nicht lokal, aber pseudolokal. Dies zeigt der nächste Satz.

Satz 8. Sei $K \subset \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$ derart, dass $P_K : \mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$, dann sind äquivalent:

- i) P_K ist pseudolokal
- ii) $\text{sing supp } K \subset \text{Diag}_\Omega$

Beweis: Ganz analog zum Beweis von Satz 6, wobei man für $i) \Rightarrow ii)$ noch die Aussage braucht, dass glättende Operatoren glatte Kerne haben, siehe Satz 11. \square

Aus Satz 8 folgt leicht folgender Satz über Fundamentallösungen E , den wir früher schon einmal bewiesen haben:

Satz 9. Sei P ein Differentialoperator auf \mathbb{R}^n mit konstanten Koeffizienten und E eine Fundamentallösung für P , d.h. $PE = \delta$. Dann sind äquivalent:

- i) P ist hypoelliptisch d.h. $\text{sing supp } Pu = \text{sing supp } u$
- ii) $\text{sing supp } E = \{0\}$.

Beweis: Betrachte den Operator P_K mit $K(x, x') = E(x - x')$. Wie früher gezeigt, ist der Faltungoperator P_K ein Inverses zu P auf $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. Nach Satz 8 gilt

$$\begin{aligned} \text{sing supp } E = \{0\} &\Leftrightarrow \text{sing supp } K = \text{Diag}_{\mathbb{R}^n} \Leftrightarrow P_K \text{ pseudolokal} \\ &\Leftrightarrow \text{sing supp } P_K f \subset \text{sing supp } f \quad \forall f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \\ &\Leftrightarrow \text{sing supp } u \subset \text{sing supp } Pu \quad \forall u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n). \end{aligned}$$

Die letzte Äquivalenz gilt wegen $P_K = P^{-1}$. Da die umgekehrte Inklusion $\text{sing supp } u \supset \text{sing supp } Pu$ sowieso gilt (denn P ist pseudolokal), folgt die Behauptung. \square

Zusammenfassung:

$$\begin{aligned} P_K \text{ lokal} &\Leftrightarrow \text{supp } K \subset \text{Diag}_\Omega \\ P_K \text{ pseudolokal} &\Leftrightarrow \text{sing supp } K \subset \text{Diag}_\Omega \end{aligned}$$

Glättende Operatoren

(Bemerkung: Hier und im folgenden Abschnitt könnte man zwar wieder verschiedene Ω , Ω' betrachten, aber wir belassen es der Einfachheit halber bei $\Omega = \Omega'$.)

Definition 10. Sei $P : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ linear und stetig. P heißt **glättend**, falls P eine stetige Fortsetzung nach $\mathcal{E}'(\Omega)$ mit Werten in $C_0^\infty(\Omega)$ hat, genauer falls $P : \mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ stetig ist.

D.h., P macht aus beliebig singulären Distributionen glatte Funktionen, ‚glättet‘ also die Singularitäten.

Satz 11. Sei $K \subset \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$. Dann sind äquivalent:

- i) P_K ist glättend
- ii) $K \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$

Beweis: $ii) \Rightarrow i)$: Ist K glatt, so ist für $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$

$$(P_K u)(x) = \int K(x, x') u(x') dx' = \langle u, K(x, \cdot) \rangle_{x'}, \quad (10)$$

eine glatte Funktion von x , nach dem Satz über Parameterabhängigkeit bei Distributionen.

Für $i) \Rightarrow ii)$ siehe Hörmander (ähnlich zum Beweis des Schwarzschen Kernsatzes). \square

Es gibt also viele glättende Operatoren: Alle P_K mit glattem Kern K .

Beachte: Ein Differentialoperator $\neq 0$ ist niemals glättend.

Adjungierte, Komposition

Zunächst sei an folgende Definition erinnert: Das *Transponierte* P^t eines Operators P ist durch die Gleichung

$$\langle P\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, P^t\psi \rangle \quad \text{für alle } \varphi, \psi \in C_0^\infty(\Omega) \quad (11)$$

charakterisiert, das (formal) *Adjungierte* P^* durch dieselbe Gleichung, wobei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ durch $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ ersetzt ist.³

Hierbei sollten noch Definitions- und Wertebereich angegeben werden. Das Grundprinzip ist dabei: Wenn $P : V \rightarrow W$, so $P^t, P^* : W^* \rightarrow V^*$, wobei V^* der Dualraum von V ist. Die Rolle von V, V^* bzw. von W, W^* kann dabei auch vertauscht werden. Typische Beispiele sind

$$P : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega) \Rightarrow P^t : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega) \quad (12)$$

$$P : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega) \Rightarrow P^t : \mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega) \quad (13)$$

Im ersten Fall können wir (11) als Definition der Distribution $P^t\psi \in \mathcal{D}'(\Omega)$ auffassen, wenn wir die rechte Seite als Anwendung von $P^t\psi$ auf die Testfunktion φ auffassen.

Im zweiten Fall macht (11) sogar für $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, $\psi \in \mathcal{E}'(\Omega)$ Sinn.

Wie bestimmt man P^t, P^* mittels der Schwartz-Kerne?

Satz 12. Sei $K \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$. Dann gilt

$$(P_K)^t = P_{K^t}, \quad (P_K)^* = P_{K^*}$$

mit

$$K^t(x, x') := K(x', x), \quad K^*(x, x') = \overline{K(x', x)}.$$

Beweis durch einfaches Nachrechnen.

Die Komposition kann auch mittels der Kerne ausgedrückt werden: Formal sieht man leicht, dass $P_K \circ P_L = P_M$ mit

$$M(x, x'') = \int K(x, x')L(x', x'')dx' \quad (14)$$

gilt. Dieses Integral (und auch die Komposition selbst) ist allerdings nur unter gewissen Bedingungen an K, L definiert (mögliche Probleme: Integrierbarkeit; bei Distributionen K, L : Produktbildung; Wertebereich von Q ist nicht im Definitionsbereich von P enthalten). Mehr dazu bei der Komposition von Pseudodifferentialoperatoren.

III.1 Ψ DOs, Grundidee

Die Grundidee von Ψ DOs wird am Beispiel des Lösens elliptischer PDGen illustriert. Uns sind bereits zwei Methoden bekannt, wie man solche Gleichungen lösen kann ($P(D)$ ist wie immer ein Differentialoperator mit konstanten Koeffizienten und $D = \frac{1}{i}\partial_x$):

- A) Falls $P = P(D)$ ein linearer Differentialoperator mit konstanten Koeffizienten ist, so kann man $Pu = f$ lösen, indem man

$$u = \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{1}{P(\xi)} \mathcal{F}f \right) \quad (15)$$

mithilfe der *Fouriertransformation* \mathcal{F} berechnet. Dies funktioniert, falls $P(\xi) \neq 0 \forall \xi$, und man hat dann sogar eine *explizite* Formel für u .

- B) Eine andere Möglichkeit ist die *Hilbertraummethode*, welche eher *abstrakt* ist. (Nicht-konstruktiver Existenzbeweis)

Ψ DOs sind eine Verallgemeinerung von A) auf den Fall variabler Koeffizienten. Dabei ergeben sich zunächst zwei Probleme:

- 1) Wir müssen eine analoge Formel wie (15) für variable Koeffizienten finden.

³Hierbei ist $\langle f, g \rangle_{L^2} = \int f\bar{g}, \langle f, g \rangle = \int fg$ für Funktionen f, g .

- 2) Die Nullstellen von $P(\xi)$ könnten dazu führen, dass die rechte Seite in (15) nicht (im klassischen Sinn) existiert. Wir werden sehen, dass Nullstellen von $P(\xi)$ für viele Fragen (z.B. Regularität) unproblematisch sind, wenn P elliptisch ist. In diesem Fall liegen die Nullstellen in einer kompakten Menge (von ξ 's) liegen.⁴

Wir konzentrieren uns vorerst auf 1). Zur Vereinfachung betrachten wir $x \in \mathbb{R}^n$ und wir schreiben lineare PDOen als

$$P = P(x, D) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha$$

und ihr Symbol als

$$p(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) \xi^\alpha.$$

Da wir Problem 2) vermeiden wollen, nehmen wir zunächst an, dass $p(x, \xi) \geq c < \xi >^k$, $c > 0$ für alle x, ξ . Die Lösungsformel für $P(x, D)u = f$ im Fall konstanter Koeffizienten lautet

$$u(x) = (Qf)(x) = \int e^{ix\xi} \frac{1}{p(\xi)} \hat{f}(\xi) d\xi$$

Es liegt nahe, im Fall variabler Koeffizienten

$$(Qf)(x) = \int e^{ix\xi} \frac{1}{p(x, \xi)} \hat{f}(\xi) d\xi \quad (16)$$

als Lösung von $PQf \stackrel{?}{=} f$ zu versuchen. Wir rechnen dies nach:

$$\begin{aligned} P(Qf)(x) &= \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D_x^\alpha \int e^{ix\xi} \frac{1}{p(x, \xi)} \hat{f}(\xi) d\xi = \\ &= \sum_{|\alpha| \leq k} \int a_\alpha(x) D_x^\alpha \left(e^{ix\xi} \frac{1}{p(x, \xi)} \right) \hat{f}(\xi) d\xi = \\ &= \sum_{|\alpha| \leq k} \int e^{ix\xi} a_\alpha(x) \left(\xi^\alpha \frac{1}{p(x, \xi)} + \sum_{\beta < \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \xi^\beta D_x^{\alpha-\beta} \frac{1}{p(x, \xi)} \right) e^{ix\xi} \hat{f}(\xi) d\xi = \\ &= f(x) + (Rf)(x), \end{aligned}$$

wobei $\beta < \alpha$ bedeutet, dass $\beta_i \leq \alpha_i \forall i$, aber $\beta \neq \alpha$. Es gilt also $PQ = I + R$, wobei

$$(Rf)(x) = \int e^{ix\xi} r(x, \xi) \hat{f}(\xi) d\xi \quad \text{mit} \quad (17)$$

$$r(x, \xi) = \sum_{\alpha \leq k} a_\alpha(x) \sum_{\beta < \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \xi^\beta D_x^{\alpha-\beta} \frac{1}{p(x, \xi)}.$$

Der Ausdruck $r(x, \xi)$ sieht kompliziert aus, aber wesentlich ist folgende Eigenschaft:

$$|r(x, \xi)| \leq C < \xi >^{-1} \quad \text{für große } |\xi| \text{ (Verhalten bei } \pm\infty). \quad (18)$$

Denn es gilt:

$$\begin{aligned} p \geq c < \xi >^k &\Rightarrow \frac{1}{p} \leq C < \xi >^{-k}, \\ D_x^\gamma \frac{1}{p} &\leq C < \xi >^{-k} \quad \text{und} \\ \beta < \alpha, |\alpha| \leq k &\Rightarrow |\xi^\beta| \leq C < \xi >^{k-1}. \end{aligned}$$

⁴Allerdings ist Elliptizität für diese Kompaktheitsaussage nicht notwendig, wie das Beispiel $P(\xi_1, \xi_2) = 1 + \xi_1^2 + \xi_2^4$ zeigt. Elliptizität wird später auch in anderer Weise wichtig.

Betrachten wir nochmal $PQ = I + R$, so stellen wir fest, dass I im Vergleich zu R in gewisser Weise ‘klein’ ist (z.B. können wir I wie in (18) schreiben, wobei r durch 1 ersetzt ist; später werden wir sehen, dass R kompakt ist auf kompakten Gebieten). Der Operator Q , der P bis auf ‘kleine’ Fehler invertiert, heißt *Parametrix* von P .

Beachte, dass wir P in der Form

$$(Pu)(x) = \int e^{ix\xi} p(x, \xi) \hat{u}(\xi) d\xi \quad (19)$$

schreiben können, ganz analog zur Parametrix Q in (16) und zum Restterm R in (17). Bei diesen war p durch $\frac{1}{p}$ bzw. r ersetzt. Pseudodifferentialoperatoren werden (im Wesentlichen) Operatoren dieser Form sein.

Unser Vorgehen wird sein:

1. Wir definieren und untersuchen eine Klasse von Funktionen (sogenannte Symbole), die wir statt p in Ausdrücken wie (19) zulassen wollen. Dies liefert eine Klasse von Operatoren, die sowohl P als auch die obigen Q und R enthält.
2. Wir untersuchen deren Eigenschaften: Abbildungseigenschaften, Schwartz-Kerne, Pseudolokalität.
3. Eine zentrale Frage ist: Wenn P und Q Ψ DOs sind, sind dann $P \circ Q$ und P^t Ψ DOs? Diese Fragen sind bei naiver Rechnung nicht einfach zu beantworten. Die Sache wird aber erleichtert, wenn man zunächst Ψ DOs etwas allgemeiner definiert als oben motiviert. In der größeren Allgemeinheit ist die Antwort dann leichter. Dann zeigen wir (‘Reduktion’), dass die größere Klasse in Wirklichkeit gleich der ursprünglichen ist.

III.2 Symbole

Was haben $p(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) \xi^\alpha$, $\frac{1}{p(x, \xi)}$ und deren Produkte und Ableitungen gemeinsam? Es stellt sich heraus, dass folgende Eigenschaft fundamental ist.

Definition 13. Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ offen und $m \in \mathbb{R}$. Definiere

$$S^m(\Omega, \mathbb{R}^n) := \{p \in C^\infty(\Omega \times \mathbb{R}^n) : \forall \alpha \in \mathbb{N}_0^N, \beta \in \mathbb{N}_0^n \forall K \Subset \Omega \exists C_{\alpha, \beta, K} \text{ mit}$$

$$|D_x^\alpha D_\xi^\beta a(x, \xi)| \leq C_{\alpha, \beta, K} \langle \xi \rangle^{m-|\beta|}$$

$$\text{für alle } \xi \in \mathbb{R}^n, x \in K\} \quad (20)$$

Wenn $p \in S^m$, dann nennen wir p ein **Symbol** der **Ordnung** m . In Worten umschrieben sind die wesentlichen Eigenschaften eines Symbols:

- p ist glatt
- p wächst höchstens wie $|\xi|^m$ für $|\xi| \rightarrow \infty$ (lokal gleichmäßig in x)
- Für jede ξ -Ableitung von p verbessert sich die Abschätzung um $|\xi|^{-1}$. Für jede x -Ableitung von p gilt dieselbe Abschätzung.

Beispiele:

1. $p(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \xi^\alpha$, alle $a_\alpha \in C^\infty(\Omega)$, dann ist $p \in S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$.
2. Ist $p \in C^\infty(\Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0))$ positiv homogen in ξ vom Grad m , d.h.

$$p(x, t\xi) = t^m p(x, \xi) \quad \text{für alle } t > 0, x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n \setminus 0$$

so ist $p(x, \xi) \chi(\xi) \in S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Hierbei ist $\chi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ eine (im Folgenden häufig verwendete) Abschneidefunktion mit den Eigenschaften

$$\chi(\xi) = \begin{cases} 0 & \text{für } |\xi| \leq 1 \\ 1 & \text{für } |\xi| \geq 2 \end{cases} \quad (21)$$

3. $p(x, \xi) = e^{i\xi}$ (für $n = 1$). Wegen $D_\xi^\beta p = e^{i\xi} \forall \beta$ ist p kein Symbol, da sich die Abschätzung bei keiner ξ -Ableitung verbessert.

(Genauer: Wäre p ein Symbol der Ordnung m , so müsste $D_\xi^\beta p(\xi)$ im Fall $\beta > m$ für $\xi \rightarrow \infty$ gegen Null gehen, das ist aber nicht der Fall.)

Proposition 14.

- a) $S^m(\Omega, \mathbb{R}^n) \cdot S^{m'}(\Omega, \mathbb{R}^n) \subset S^{m+m'}(\Omega, \mathbb{R}^n)$
- b) $D_{x_j} : S^m(\Omega, \mathbb{R}^n) \rightarrow S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$
 $D_{\xi_j} : S^m(\Omega, \mathbb{R}^n) \rightarrow S^{m-1}(\Omega, \mathbb{R}^n)$
- c) Sei $p \in S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$ und $|p(x, \xi)| \geq |\xi|^m$, für $|\xi| \geq R$, $c > 0$. Sei $\chi_R(\xi) = \chi(\frac{\xi}{R})$ mit χ aus (21).
 Dann ist

$$q(x, \xi) = \frac{\chi_R(\xi)}{p(x, \xi)} \in S^{-m}(\Omega, \mathbb{R}^n)$$

Beweis: a) Wir prüfen zunächst die Symbolabschätzung ohne Ableitungen nach:
 $|p| \leq C < \xi >^m$, $|p'| \leq C < \xi >^{m'}$ dann folgt $|pp'| \leq C < \xi >^{m+m'}$. Mit Ableitungen:

$$\begin{aligned} |D_x^\alpha D_\xi^\beta (pp')| &= \left| \sum_{\gamma \leq \alpha} \sum_{\delta \leq \beta} \binom{\alpha}{\gamma} \binom{\beta}{\delta} (D_x^\gamma D_\xi^\delta p) D_x^{\alpha-\gamma} D_\xi^{\beta-\delta} p' \right| \leq \\ &\leq C < \xi >^{m+m'-(|\delta|+|\beta-\delta|)} = C < \xi >^{m+m'-|\beta|} \end{aligned}$$

b) klar

c) q ist glatt, da p auf $\text{supp } \chi_R$ keine Nullstellen hat, und es gilt:

$$|q(x, \xi)| \begin{cases} \leq C |\xi|^{-m} & \text{in } |\xi| \geq R \\ = 0 & \text{in } |\xi| \leq R, \end{cases}$$

also $|q(x, \xi)| \leq C < \xi >^{-m} \forall x, \xi$. Dann zeigt man mit Induktion

$$D_x^\alpha D_\xi^\beta \frac{\chi_R}{p} = \frac{s}{p^{|\alpha|+|\beta|+1}}, \quad s \in S^{m|\alpha|+(m-1)|\beta|}(\Omega, \mathbb{R}^n)$$

Daraus folgt dann die Behauptung. Für $\alpha = \beta = 0$ stimmt das, und

$$\begin{aligned} \alpha_j \rightarrow \alpha_j + 1 : \quad D_{x_j} \frac{r}{p^N} &= \frac{D_{x_j} r}{p^N} - N \frac{r D_{x_j} p}{p^{N+1}} = \frac{p D_{x_j} r - N r D_{x_j} p}{p^{N+1}}, \\ \beta_j \rightarrow \beta_j + 1 : \quad D_{\xi_j} \frac{r}{p^N} &= \frac{p D_{\xi_j} r - N r D_{\xi_j} p}{p^{N+1}}. \end{aligned}$$

Im ersten Fall nimmt die Ordnung des Zählers um m zu, im zweiten um $m - 1$, damit folgt der Induktionsschluss. □

Fouriertransformation von Symbolen

Als Vorbereitung auf die Untersuchung von Ψ DOs betrachten wir hier Symbole, die nur von ξ abhängen, und deren (inverse) Fouriertransformation.

Definition 15. $S^m(\mathbb{R}^n) := \{p \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \forall \alpha \exists C_\alpha : |D_\xi^\alpha p(\xi)| \leq C_\alpha < \xi >^{m-|\alpha|}\}$

Satz 16. Sei $p \in S^m(\mathbb{R}^n)$. Die inverse Fouriertransformation \check{p} hat folgende Eigenschaften.

- a) $\text{sing supp } \check{p} \subset \{0\}$. Genauer: $w^\beta \check{p}(w) \in C_b^k(\mathbb{R}^n)$ für $|\beta| > m + n + k$
- b) $\check{p} \chi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ mit Abschneidefunktion χ wie in (21)
- c) Falls $\check{p} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, so ist $p \in S^{-\infty}(\mathbb{R}^n) := \bigcap_{m \in \mathbb{R}} S^m(\mathbb{R}^n)$

Bemerkungen:

- $S^m(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, also ist $\check{p} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ definiert.

- Der im Folgenden wichtigste Teil ist a). Es zeigt, dass die Symbolabschätzungen von p (Verhalten $\xi \rightarrow \infty$) die Lage (und 'Stärke') der Singularität von \check{p} bestimmen: Singularität bei Null entspricht wenig Oszillation für große ξ . Dazu zwei Beispiele mit $n = 1$:

a) $p(\xi) = \xi^k \Rightarrow \check{p} = c\delta^{(k)}$.

b) $p(\xi) = e^{i\xi}$ ist kein Symbol, $\check{p} = 2\pi\delta(w + 1)$ und $\text{sing supp } \check{p} = \{-1\}$

- b) drückt aus, dass Glattheit von p schnelles Abfallen von \check{p} bei unendlich bewirkt.
- c) kehrt a) um: Ist p Symbol und hat \check{p} keine Singularität, so muss die Symbolordnung $-\infty$ sein.

Beweis: a) $w^\beta \check{p}(w) = \pm \overline{(D_\xi^\beta a)}$. Wegen $|D_\xi^\beta p| \leq C_\beta < \xi >^{m-|\beta|}$ ist $D_\xi^\beta p \in L^1$ für $m - |\beta| < -n$. Also ist $w^\beta \check{p} \in C_b^0$, falls $|\beta| > m + n$. Dies ist die Behauptung im Fall $k = 0$.

Allgemeiner gilt: $D_w^\gamma w^\beta \check{p} = \pm (\xi^\gamma D_\xi^\beta p)$, und $\xi^\gamma D_\xi^\beta p \in L^1$ für $|\gamma| + m - |\beta| < -n$, also $D_w^\gamma w^\beta \check{p} \in C_b^0$ für $|\beta| > m + n + |\gamma|$. Damit folgt die zweite Aussage von a).

Die Aussage über den singulären Träger folgt hieraus im Fall $n = 1$ unmittelbar (teile durch w^β). In höheren Dimensionen hat w^β auch andere Nullstellen als 0, daher argumentieren wir wie folgt: Für $l \in \mathbb{N}$ betrachte $|w|^{2l} = (w_1^2 + \dots + w_n^2)^l = \sum_{|\beta|=2l} c_\beta w^\beta$. Also ist $|w|^{2l} \check{p}(w) \in C_b^k(\mathbb{R}^n)$, falls $2l > m + n + k$. Teile durch $|w|^{2l}$, dann folgt $\check{p} \in C_b^k(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ für alle k , d.h. $\text{sing supp } \check{p} \subset \{0\}$.

- b) Zu zeigen ist, dass $w^\beta D_w^\gamma (\check{p}\chi) \forall \beta, \gamma$ beschränkt ist. Dies ist äquivalent dazu (Übung), dass $D_w^\gamma w^\beta \check{p}\chi$ beschränkt ist $\forall \beta, \gamma$, und letzteres wurde oben gezeigt.

- c) Falls \check{p} glatt ist, dann ist $\check{p}(1 - \chi) \in C_0^\infty$ und aus b) folgt dann $\check{p} \in \mathcal{S} \Rightarrow p \in \mathcal{S} = \mathcal{S}^{-\infty}$. \square

Bemerkung:

Formal ausgeschrieben folgt $w^\beta \check{p} = \pm \overline{(D_\xi^\beta p)}$ durch partielle Integration:

$$\check{p}(w) = \int e^{iw\xi} p(\xi) d\xi, \quad \text{dann}$$

$$\overline{(D_\xi^\beta p)}(w) = \int e^{iw\xi} D_\xi^\beta p(\xi) d\xi = \int ((-D_\xi)^\beta e^{iw\xi}) p(\xi) d\xi = \pm w^\beta \check{p}(w)$$

Das bedeutet, dass in dieser Situation "partielle Integration" zulässig ist, obwohl die Integrale divergieren (jedenfalls für $m \geq -n$). Im Folgenden ist es sehr hilfreich, diese Schreibweise zu verwenden.

III.3 Ψ DOs: Definition, Schwartz Kern und Abbildungseigenschaften

Das Unterkapitel III.1 hat gezeigt, dass beim Versuch, die Methode der Fouriertransformation auf das Lösen von PDGen mit variablen Koeffizienten anzuwenden, Integrale der Form

$$\int e^{ix\xi} p(x, \xi) \underbrace{\hat{u}(\xi)}_{=\int e^{-iy\xi} u(y) dy} d\xi = \iint e^{i(x-y)\xi} p(x, \xi) u(y) dy d\xi$$

auftreten: Sowohl der Operator P als auch die Parametrix Q und der Restterm R ließen sich in dieser Form (mit unterschiedlichen Funktionen p) schreiben. Operatoren dieser Form werden also unsere Pseudodifferentialoperatoren sein.

Für spätere Beweise und eine systematische Theorie ist es nützlich, zunächst etwas allgemeinere Ausdrücke zu betrachten, bei denen die Funktion $p(x, \xi)$ im rechten Integral durch eine Funktion $a(x, y, \xi)$ ersetzt wird. Im Folgenden ist immer $x \in \Omega$, $y \in \Omega$, $\xi \in \mathbb{R}^n$, und x - oder y -Integrale laufen immer über Ω , ξ -Integrale immer über \mathbb{R}^n .

Definition 17. Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen, $m \in \mathbb{R}$, $a \in S^m(\Omega \times \Omega, \mathbb{R}^n)$. Dann heißt der durch

$$(P_a u)(x) := \iint e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi) u(y) dy d\xi, \quad u \in C_0^\infty(\Omega) \tag{22}$$

definierte Operator **Pseudodifferentialoperator** (ΨDO) der **Ordnung** m mit **Amplitude** a .
Weiter definieren wir

$$\Psi^m(\Omega) := \text{die Menge der } \Psi DO \text{ auf } \Omega \text{ der Ordnung } m.$$

Beispiele:

- Sei $\text{Diff}^m(\Omega)$ die Menge der Differentialoperatoren auf Ω der Ordnung m . Dann ist

$$\text{Diff}^m(\Omega) \subset \Psi^m(\Omega)$$

Denn für $P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha$ ist $P = P_a$ mit $a(x, y, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) \xi^\alpha$ nach (19).

Zwei konkrete, physikalisch bedeutsame Beispiele hierfür sind:

- $a(x, \xi) = |\xi|^2 + V(x)$ mit $V \in C^\infty$, dann ist $P_a = -\Delta + V$ (Schrödinger-Operator)
- $a(x, \xi) = x \cdot \xi \Rightarrow P_a = x \cdot D$. Hier ist interessant, dass $p(x, \xi) = x \cdot \xi = \xi \cdot x$ gilt, aber $x \cdot D \neq D \cdot x$. Darauf kommen wir später zurück.

Wir formulieren nun die grundlegenden Sätze zu ΨDO s und verschieben die Beweise nach hinten. Zunächst sollten wir sicherstellen, dass $P_a u$ überhaupt definiert ist (d.h. dass die Integrale konvergieren) und P_a einen vernünftigen Operator definiert.

Satz 18. Sei $a \in S^m(\Omega \times \Omega, \mathbb{R}^n)$. Dann ist $(P_a u)(x)$ für $u \in C_0^\infty(\Omega)$ definiert, $P_a u \in C^\infty(\Omega)$ und der Operator

$$P_a : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$$

ist linear und stetig. Weiterhin hat P_a eine stetige Fortsetzung

$$P_a : \mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$$

Wir betrachten nun den Schwartz Kern eines ΨDO s. Er hat folgende fundamentale Eigenschaften.

Satz 19. Sei $a \in S^m(\Omega \times \Omega, \mathbb{R}^n)$. Der Schwartz Kern von P_a ist

$$K_a(x, y) := \int e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi) d\xi \quad (23)$$

Beachten Sie, dass hier eine Überlegung nötig ist, was dies bedeuten soll, da das Integral für $m \geq -n$ im Allgemeinen divergiert. Wir werden sehen, dass es im Sinne der Distributionen trotzdem für alle m definiert ist.

Satz 20. Der Schwartz Kern eines ΨDO s ist nur auf der Diagonale singulär:

$$a \in S^m(\Omega \times \Omega, \mathbb{R}^n) \Rightarrow \text{sing supp } K_a \subset \text{Diag}_\Omega$$

Inbesondere sind ΨDO s pseudolokal, d.h. für $P \in \Psi^m(\Omega)$ gilt

$$\text{sing supp } Pu \subset \text{sing supp } u \quad \text{für alle } u \in \mathcal{E}'(\Omega)$$

Der zweite Teil folgt aus dem ersten mittels Satz 8. Schließlich betrachten wir noch Adjungierte von ΨDO s:

Satz 21. Sei $P \in \Psi^m(\Omega)$. Dann ist $P^* \in \Psi^m(\Omega)$. Genauer gilt für $a \in S^m(\Omega \times \Omega, \mathbb{R}^n)$

$$(P_a)^* = P_{a^*} \quad \text{mit } a^*(x, y, \xi) = \overline{a(y, x, \xi)} \quad (24)$$

Wir kommen nun zu den Beweisen. Wir gehen in zwei Schritten vor:

1. Wir rechnen formal und kümmern uns nicht um Konvergenz. Daran sieht man am besten, woher die Aussagen kommen. Im Fall, dass m genügend negativ ist, gibt es kein Konvergenzproblem und wir sind fertig.
2. Wir zeigen, dass die Aussagen auch für beliebige m gelten. Der wesentliche Trick ist hierbei eine partielle Integration (bzgl. y).

Beweise: Die zentralen Punkte

Zu Satz 18 bemerken wir zunächst nur, dass das $dy d\xi$ -Integral (22) für $m < -n$ absolut konvergiert. Daher ist $P_a u$ zumindest stetig. Ist sogar $m < -n - k$, so kann man k mal unter dem Integral nach x ableiten und erhält $Pu \in C^k(\Omega)$.

Beweis (von Satz 19 im Fall $m < -n$): Wenn $m < -n$ ist, so konvergiert das Integral, das K_a definiert. Außerdem konvergiert das $dy d\xi$ -Integral (22) absolut, daher kann man Fubini anwenden und erhält $(P_a u)(x) = \int K_a(x, y)u(y) dy$, d.h. K_a ist der Schwartz Kern von P_a . \square

Für später halten wir noch fest:

$$K_a \in C^k(\Omega \times \Omega) \quad \text{für } a \in S^m, \quad m < -n - k. \quad (25)$$

Denn $D_{x,y}^\alpha (e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi)) \leq C < \xi >^{m+|\alpha|}$, und dies ist für $m + |\alpha| < -n$ bzgl. ξ integrierbar.

Beweis (von Satz 21): Nach Satz 12 hat $(P_a)^*$ den Schwartz-Kern

$$\overline{K(y, x)} = \int e^{i(y-x)\xi} \overline{a(y, x, \xi)} d\xi = \int e^{i(x-y)\xi} \overline{a(y, x, \xi)} d\xi = K_{a^*} \quad \square$$

Für Satz 20 benötigen wir folgende wichtige Formel:

Proposition 22. Für $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ gilt

$$(y - x)^\alpha K_a = K_{(y-x)^\alpha a} = K_{D_\xi^\alpha a}$$

Dies zeigt insbesondere, dass verschiedene Amplituden denselben Kern (und damit Ψ DO) definieren können.

Beweis (von Proposition 22 im Fall $m < -n$): Die erste Gleichheit ist klar. Für die zweite schreibe

$$\begin{aligned} K_{(y-x)^\alpha a}(x, y) &= \int (y-x)^\alpha e^{i(x-y)\xi} a d\xi = \int \left((-D_\xi)^\alpha e^{i(x-y)\xi} \right) a d\xi = \\ &= \int e^{i(x-y)\xi} D_\xi^\alpha a d\xi \end{aligned}$$

mit mehrfacher partieller Integration in ξ . \square

Beweis (von Satz 20): Nach Proposition 22 ist $(y-x)^\alpha K_a = K_{D_\xi^\alpha a}$, und aus $D_\xi^\alpha a \in S^{m-|\alpha|}$ folgt, dass

$$(y-x)^\alpha K_a \in C^k(\Omega \times \Omega), \quad \text{falls } m - |\alpha| < -n - k,$$

d.h. falls $|\alpha| > m + n + k$. Der Satz folgt nun in derselben Weise, wie in Satz 16a) aus $w^\beta \check{p} \in C^k(\mathbb{R}^n)$ für $|\beta| > m + n + k$ folgt, dass $\text{sing supp } \check{p} \subset \{0\}$. Hier ist w durch $y - x$ ersetzt, daher erhält man, dass K für $y - x \neq 0$, also außerhalb der Diagonale, glatt ist. \square

Beweise: Wie man divergente Integrale konvergent macht

Im Endeffekt sagen die Sätze 18 - 21, dass man mit den hier vorkommenden Integralen formal rechnen darf, ohne sich um Konvergenz zu kümmern. Hierfür ist allerdings wesentlich, dass a die Symbolabschätzungen erfüllt.

Wir wollen dies nun genau begründen. Beim ersten Lesen kann dieser Abschnitt übersprungen werden. Es ist noch zu klären:

- Beweis von Satz 18: Warum gilt das für beliebige m , und warum kann man Pu unendlich oft differenzieren, obwohl Ableitungen nach x unterm Integral bewirken, dass das Integral 'immer schlimmer' divergiert?
- Definition von K_a , Beweis von Satz 19 für beliebige m
- Beweis von Proposition 22 für beliebige m .

Beachte, dass bei all diesen Punkten das Problem darin besteht, dass das ξ -Integral möglicherweise divergiert, da der Integrand für $|\xi| \rightarrow \infty$ nicht (oder nicht offensichtlich) schnell genug gegen Null geht. Das y -Integral ist kein Problem, da u kompakten Träger in Ω hat und glatt ist.

Idee: Der zentrale Trick ist, wie so oft, **partielle Integration**, diesmal bezüglich y : Schreibe $e^{i(x-y)\xi} = -\frac{1}{\xi_j} D_{y_j} e^{i(x-y)\xi}$ Setzt man dies in (22) ein und integriert partiell bzgl. y_j , so verbessert sich die Konvergenz des ξ -Integrals bei unendlich wegen der negativen ξ_j -Potenz.

Da Teilen durch ξ_j aber ein neues Problem bei $\xi_j = 0$ generiert, modifizieren wir diese Idee ein wenig: Es gilt

$$e^{-iy\xi} = \langle \xi \rangle^{-k} \langle D_y \rangle^k e^{-iy\xi}, \quad k \in \mathbb{N} \text{ gerade} \quad (26)$$

wobei wir $\langle D_y \rangle^2 = 1 + \sum_{j=1}^n D_{y_j}^2$ schreiben.

(Beweis: Aus $D_{y_j} e^{-iy\xi} = -\xi_j e^{-iy\xi}$ folgt durch zweifache Anwendung, Summieren über j und Addieren von $e^{-iy\xi}$, dass $(1 + \sum_{j=1}^n D_{y_j}^2) e^{-iy\xi} = (1 + |\xi|^2) e^{-iy\xi}$ gilt. Mehrfache Anwendung liefert $(1 + \sum_{j=1}^n D_{y_j}^2)^l e^{-iy\xi} = (1 + |\xi|^2)^l e^{-iy\xi}$ für $l \in \mathbb{N}$. Durch Umstellen folgt (26).)

Beweis (von Satz 18): Sei $u \in C_0^\infty(\Omega)$. Wir müssen das Doppelintegral

$$(P_a u)(x) := \iint e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi) u(y) dy d\xi \quad (27)$$

untersuchen. Betrachte zunächst das innere Integral

$$A(x, \xi) := \int e^{-iy\xi} a(x, y, \xi) u(y) dy.$$

Dieses ist offenbar konvergent. Wir werden zeigen, dass $A(x, \xi)$ für $\xi \rightarrow \infty$ schnell abfällt, so dass das Doppelintegral (27) existiert⁵. Wir verwenden (26) und integrieren partiell bzgl. y . Da $\langle D_y \rangle^k$ eine endliche Linearkombination von Termen der Form $D_{y_j}^{2l}$ ist, treten dabei keine Minuszeichen auf. Für beliebige gerade $k \in \mathbb{N}$ erhalten wir

$$A(x, \xi) = \langle \xi \rangle^{-k} \int (\langle D_y \rangle^k e^{-iy\xi}) a u dy = \langle \xi \rangle^{-k} \int e^{-iy\xi} \langle D_y \rangle^k (a u) dy \quad (28)$$

und da $u \in C_0^\infty(\Omega)$ und $|D_y^\alpha a(x, y, \xi)| \leq C_{K, K', \alpha} \langle \xi \rangle^m$ für $x \in K' \Subset \Omega$, $y \in K \Subset \Omega$, folgt

$$|A(x, \xi)| \leq C_{K, K', k, u} \langle \xi \rangle^{m-k} \quad \text{für } \text{supp } u \subset K \Subset \Omega, x \in K' \Subset \Omega \quad (29)$$

Leitet man (28) nach x ab, folgt

$$|D_x^\beta A(x, \xi)| \leq C_{K, K', k, u, \beta} \langle \xi \rangle^{m-k} \quad \text{für } \text{supp } u \subset K \Subset \Omega, x \in K' \Subset \Omega, \forall \beta \quad (30)$$

Da k , K und K' beliebig waren, haben wir gezeigt, dass $D_x^\beta A = O(\langle \xi \rangle^{-N})$ für alle N gilt, lokal gleichmäßig in x . Daraus folgt sofort, dass das Integral

$$(P_a u)(x) = \int e^{ix\xi} A(x, \xi) d\xi$$

konvergiert und stetig in x ist, und dass beliebig häufiges Ableiten nach x unterm Integral immer zu konvergenten Integralen führt. Damit ist bewiesen, dass $(P_a u)(x)$ definiert ist und dass $P_a u \in C^\infty(\Omega)$.

Es bleibt die Stetigkeit des Operators $P_a : C_0^\infty \rightarrow C^\infty$ zu zeigen. Diese folgt daraus, dass sich die Konstanten in (30) durch die Suprema endlich vieler Ableitungen von u abschätzen lassen.

Dass P_a eine stetige Fortsetzung $\mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ hat, folgt mit Hilfe des üblichen Dualitätsarguments (siehe (13)) daraus, dass der transponierte Operator P_a^t ebenfalls ein Ψ DO ist (nach dem schon bewiesenen Satz 21) und daher stetig $C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ ist. \square

⁵Dabei muss das Integral (27) in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden: erst das y -Integral auswerten, dann das ξ -Integral.

Beachte, dass im Fall $a = a(x, \xi)$ einfach $A(x, \xi) = a(x, \xi)\hat{u}(\xi)$ ist. Die Abschätzungen im Beweis verallgemeinern die wohlbekanntete Tatsache, dass \hat{u} eine Schwartz-Funktion ist. Der Standard-Beweis für diese Tatsache ist im Wesentlichen identisch zum oben gegebenen Beweis.

Wir präzisieren nun, was wir mit der Formel

$$K_a(x, y) := \int e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi) d\xi$$

meinen: Wir definieren die Distribution $K_a \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$ durch

$$\langle K_a, \phi \rangle := \int \int \int e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi) \phi(x, y) dy dx d\xi \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega \times \Omega) \quad (31)$$

(Integrationen in dieser Reihenfolge, wobei es statt $dy dx$ auch $dx dy$ heißen könnte).⁶

Die Integrale in (31) konvergieren (in dieser Reihenfolge), denn analog zum vorigen Beweis gilt für das innere Integral über x, y

$$\begin{aligned} \left| \int \int e^{i(x-y)\xi} a \phi dy dx \right| &= | \langle \xi \rangle^{-k} \int \int e^{i(x-y)\xi} \langle D_y \rangle^k (a \phi) dy dx | \leq \\ &\leq C_{K,k,u} \langle \xi \rangle^{m-k} \quad \forall \phi, \text{supp } \phi \subset K \Subset \Omega \times \Omega, \end{aligned}$$

wobei $C_{K,k,u} \leq C_{K,k} \sup_{|\gamma| \leq k} \sup_{x,y} |D_y^\gamma \phi|$. Wählt man nun $k > m + n$, dann konvergiert das ξ -Integral, d.h. $\langle K_a, \phi \rangle$ ist definiert. Weiterhin folgt

$$| \langle K_a, \phi \rangle | \leq C'_{K,k} \sup_{|\gamma| \leq k} \sup_{x,y} |D_y^\gamma \phi|$$

und dies zeigt, dass $K_a \in \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$.

Beweis (von Satz 19): Die Aussage „ K_a ist Schwartz-Kern von P_a “ bedeutet per Definition (siehe (8)):

$$\langle P_a u, v \rangle = \langle K_a, v \otimes u \rangle \quad \forall u, v \in C_0^\infty(\Omega).$$

Nun ist

$$\begin{aligned} \langle P_a u, v \rangle &= \int \left[\int \int e^{i(x-y)\xi} a u(y) dy d\xi \right] v(x) dx \quad \text{und} \\ \langle K_a, v \otimes u \rangle &= \int \int \int e^{i(x-y)\xi} a v(x) u(y) dy dx d\xi. \end{aligned}$$

Beide Integrale sind gleich, wenn wir Fubini anwenden dürfen, um die dx und $d\xi$ -Integrale zu vertauschen. Da wir das y -Integral wie vorher als $\langle \xi \rangle^{-k} \int \dots dy$ umschreiben können, konvergiert das $dx d\xi$ -Integral, also ist Fubini anwendbar. \square

Für den Beweis von Proposition 22 benötigen wir folgendes Lemma.

Lemma 23. Sei $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\rho(0) = 1$, $\rho_N(\xi) = \rho\left(\frac{\xi}{N}\right)$. Dann gilt

$$K_a = \lim_{N \rightarrow \infty} K_{a \rho_N}$$

in $\mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$.

Beachte, dass $a \cdot \rho_N \in S^{-\infty}$. Das heißt, das Lemma gibt eine Approximation von K_a durch glatte Kerne.

⁶Auf den ersten Blick mag diese Integrationsreihenfolge unmotiviert erscheinen. Die Definition ist jedoch eine natürliche Verallgemeinerung der Definition der Summe von Distributionen: Für Distributionen f_j ist $\sum_j f_j$ definiert durch $\langle \sum_j f_j, \phi \rangle := \sum_j \langle f_j, \phi \rangle$. Analog sollte also das Integral von Distributionen über einen Parameter definiert werden. In diesem Fall ist der Parameter ξ . Ersetzen wir also die j -Summe durch das ξ -Integral und wenden dies auf $f_\xi = e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi)$ (interpretiert als Distribution in x, y) an, ergibt sich genau (31).

Beweis: Wie beim Argument nach (31) schreiben wir

$$\begin{aligned} \langle K_{a\rho_n}, \phi \rangle &= \int \int \int e^{i(x-y)\xi} a \rho_N(\xi) dy dx d\xi = \int \rho_N(\xi) \int \int e^{i(x-y)\xi} a dy dx d\xi = \\ &= \int \rho_N(\xi) \langle \xi \rangle^{-k} \left(\int \int e^{i(x-y)\xi} \langle D_y \rangle^k (a\phi) dy dx \right) d\xi \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \langle K_a, \phi \rangle, \end{aligned}$$

für $k > m + n$ nach dem Satz über dominierte Konvergenz, da $\rho_N(\xi) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \rho(0) = 1$ für jedes ξ und da das ξ -Integral ohne den ρ_N -Faktor absolut konvergiert. \square

Der Beweis zeigt auch, dass für beliebiges $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ gilt: $K_{a\rho_N} \rightarrow \rho(0)K_a$.

Beweis (von Proposition 22): Dies hatten wir bereits für $m < -n$ bewiesen. Für beliebiges m verwenden wir Lemma 23. Es genügt, $\alpha = e_j$ zu betrachten. Sei $\tilde{\rho} = D_{\xi_j} \rho$ und $\tilde{\rho}_N(\xi) = \tilde{\rho}(\frac{\xi}{N})$, dann ist $D_{\xi_j} \left(\rho \left(\frac{\xi}{N} \right) \right) = \frac{1}{N} (D_{\xi_j} \rho) \left(\frac{\xi}{N} \right) = \frac{1}{N} \tilde{\rho}_N$. Wegen $a\rho_N \in S^{-\infty}$ gilt für jedes N

$$\underbrace{(y-x)_j K_{a\rho_N}}_{\rightarrow (y-x)_j K_a} = \underbrace{K_{(y-x)_j a \rho_N}}_{\rightarrow K_{(y-x)_j a}} = K_{D_{\xi_j}(a\rho_N)} = \underbrace{K_{(D_{\xi_j} a)\rho_N}}_{\rightarrow K_{D_{\xi_j} a}} + \underbrace{K_{a \frac{1}{N} \tilde{\rho}}}_{\rightarrow 0},$$

weil im letzten Term $K_{a\tilde{\rho}_N} \rightarrow \tilde{\rho}(0)K_a$, also $K_{a\frac{1}{N}\tilde{\rho}} = \frac{1}{N}K_{a\tilde{\rho}_N} \rightarrow 0$. \square

Bemerkung: Man könnte auch versuchen, beim Beweis von Proposition 22 wie in den vorherigen Beweisen zu argumentieren, indem man mittels der $\langle \xi \rangle^{-k}$ -Faktoren die Integrale konvergent macht. Das führt aber zu unnötigen algebraischen Verwicklungen, denn zum Beweis von Proposition 22 muss man bzgl. ξ ableiten und partiell integrieren, und dabei werden die $\langle \xi \rangle^{-k}$ -Faktoren mit abgeleitet. Daher ist es einfacher, über Lemma 23 zu argumentieren.

III.4 Asymptotische Summation

Im Folgenden schreiben wir oft kurz S^m für $S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, oder für $S^m(\mathbb{R}^n)$.

Definition 24. Seien $a_j \in S^{m_j}$ mit $m_0 \geq m_1 \geq m_2 \geq \dots \rightarrow -\infty$. Sei $a \in S^{m_0}$. Wir sagen

$$a \sim \sum_{j=0}^{\infty} a_j \quad (\text{asymptotische Summe})$$

falls gilt:

$$a - \sum_{j:m_j > -M} a_j \in S^{-M} \quad \text{für alle } M$$

Beachten Sie, dass die Partialsumme $\sum_{j:m_j > -M} a_j$ endlich ist. Dies ist ähnlich zur Definition der Summe von Reihen: Für reelle Zahlen x, x_j ist $x = \sum_{j=0}^{\infty} x_j \Leftrightarrow x - \sum_{j=0}^M x_j \rightarrow 0$ für $M \rightarrow \infty$. Der wichtigste Spezialfall ist $m_j = m - j$:

$$a_j \in S^{m-j}, \text{ dann } a \sim \sum_{j=0}^{\infty} a_j \Leftrightarrow a - \sum_{j=0}^{k-1} a_j \in S^{m-k} \quad \forall k$$

Beispiel: $a(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$ ist nach Proposition 14 ein Symbol der Ordnung -2 auf \mathbb{R} . Für $|\xi| > 1$ ist

$$\frac{1}{1+\xi^2} = \frac{1}{\xi^2} \frac{1}{1+\frac{1}{\xi^2}} = \xi^{-2} - \xi^{-4} + \xi^{-6} - + \dots$$

Bis auf die Singularität bei $\xi = 0$ stehen rechts Symbole abnehmender Ordnung. Mit χ wie in (31) (mit R beliebig) erwarten wir also, dass gilt

$$\frac{1}{1+\xi^2} \sim \sum_{j=0}^{\infty} a_j, \quad a_j(\xi) = \xi^{-2-2j} \chi(\xi)$$

Um dies genau zu begründen, müssen wir den Rest nach Abziehen einer Partialsumme betrachten: Für alle k gilt (geometrische Summe)

$$\frac{1}{1 + \xi^2} = - \sum_{j=1}^k (-\xi^2)^{-j} + \frac{(-\xi^2)^{-k}}{1 + \xi^2}$$

und $\frac{(-\xi^2)^{-k}}{1 + \xi^2} \in S^{-2-2k}(\mathbb{R})$.

In diesem Beispiel war die Summe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j(\xi)$ sogar für jedes ξ konvergent. Im Allgemeinen muss dies jedoch nicht der Fall sein. Zum Beispiel könnte man die Summe $\sum_{j=0}^{\infty} j! \xi^{-2j} \chi(\xi)$ betrachten. Diese konvergiert für kein ξ mit $\chi(\xi) \neq 0$. Dass und in welchem Sinn die Summe trotzdem definiert ist, zeigt folgender Satz.

Satz 25. Seien $a_j \in S^{m_j}$, $m_0 \geq m_1 \geq m_2 \geq \dots \rightarrow -\infty$.

a) Es existiert $a \in S^{m_0}$ mit

$$a \sim \sum_{j=0}^{\infty} a_j.$$

b) a ist eindeutig mod $S^{-\infty}$, d.h.: Falls $\tilde{a} \sim \sum_{j=0}^{\infty} a_j$ für ein Symbol \tilde{a} , so folgt $a - \tilde{a} \in S^{-\infty}$.

Beachte, dass a priori klar ist, dass die Summe nur mod $S^{-\infty}$ eindeutig sein kann, denn falls $a \sim \sum a_j$ und $\tilde{a} \in S^{m_0}$ mit $a - \tilde{a} \in S^{-\infty}$, so folgt $\tilde{a} \sim \sum a_j$.

Beweis:

Eindeutigkeit mod $S^{-\infty}$: Gilt $a \sim \sum a_j$, $\tilde{a} \sim \sum a_j$, so folgt per Definition für jedes M

$$a - \sum_{m_j > -M} a_j \in S^{-M}, \quad \tilde{a} - \sum_{m_j > -M} a_j \in S^{-M}$$

Nimmt man die Differenz, so folgt $a - \tilde{a} \in S^{-M}$. Da dies für alle M gilt, folgt $a - \tilde{a} \in S^{-\infty}$.

Beweisskizze der Existenz: Man setzt

$$a(x, \xi) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j(x, \xi) \chi\left(\frac{\xi}{R_j}\right), \quad R_j \rightarrow \infty \text{ für } j \rightarrow \infty.$$

Für jedes x, ξ ist dies eine endliche Summe und somit konvergiert die Reihe (χ sei wie in (21)). Man zeigt nun, dass man R_j so wählen kann, dass $a \in S^{m_0}$ und $a \sim \sum a_j$. \square

III.5 Restterme

In Satz 25 haben wir gesehen, dass gewisse Aussagen nur modulo $S^{-\infty}$ gelten. Solche Symbole, bzw. die zugehörigen Operatoren, werden wir daher als Restterme, die wir nicht genauer bestimmen können, ansehen. Wir definieren

$$S^{-\infty}(\Omega, \mathbb{R}^n) := \bigcap_{m \in \mathbb{R}} S^m(\Omega, \mathbb{R}^n), \quad \Psi^{-\infty}(\Omega) := \bigcap_{m \in \mathbb{R}} \Psi^m(\Omega).$$

Diese Schreibweise ist sinnvoll, da $S^m \supset S^{m-1} \supset S^{m-2} \supset \dots$ und $\Psi^m(\Omega) \supset \Psi^{m-1}(\Omega) \supset \dots$.

Satz 26. Sei P ein ΨDO . Dann sind äquivalent:

- i) $P \in \Psi^{-\infty}(\Omega)$
- ii) P ist glättend

Zur Erinnerung: P glättend bedeutet, dass $P : \mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$, und dies ist äquivalent zu $K \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$ für den Schwartz Kern K von P .

Beweis:

i) \Rightarrow ii): Für $P \in \Psi^m$ mit Kern K ist $K \in C^k$ für $k < -m - n$ nach (25). Für $P \in \bigcap_{m \in \mathbb{R}} \Psi^m$ mit Kern K folgt also $K \in \bigcap_k C^k = C^\infty$.

ii) \Rightarrow i): Sei $K \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$ der Kern von P . Wähle $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ mit $\int \rho = 1$. Setze $a(x, y, \xi) = e^{-i(x-y)\xi} K(x, y) \rho(\xi)$, dann ist $a \in S^{-\infty}$, da es kompakten Träger in ξ hat. Außerdem gilt $K_a = K$. Also $a \in S^m \forall m$, d.h. $P \in \Psi^m \forall m$ und damit $P \in \Psi^{-\infty}$ \square

Der Beweis zeigt auch, dass die Bedingungen äquivalent sind zu $P = P_a$ für ein $a \in S^{-\infty}(\Omega \times \Omega, \mathbb{R}^n)$.

Schreibweise: $P \equiv P' \pmod{\Psi^{-\infty}} \Leftrightarrow P - P' \in \Psi^{-\infty}$. Nach dem Satz ist dies äquivalent zu $K - K' \in C^\infty$, d.h. K, K' haben dieselbe Singularität bei Diag_Ω .

III.6 Reduktion, Symbol eines Ψ DOs

In diesem Abschnitt zeigen wir, dass man einen Ψ DO, der durch eine Amplitude $a(x, y, \xi)$ gegeben ist, auch durch eine Amplitude darstellen kann, die nur von x und ξ abhängt, nicht von y (bis auf einen $\Psi^{-\infty}$ Restterm), und dass diese bis auf Restterme eindeutig ist. Man nennt sie das Symbol des Ψ DOs. Das Symbol enthält die wesentlichen Informationen über den Operator.

Der Fall von Differentialoperatoren

Für Differentialoperatoren ist leicht zu verstehen, was die y -Abhängigkeit einer Amplitude $a(x, y, \xi)$ bedeutet:

$$(L) \quad P = \sum_{\alpha} a_{\alpha} D^{\alpha} \quad \Rightarrow \quad P = P_p \text{ mit } p = p(x, \xi) = \sum_{\alpha} a_{\alpha}(x) \xi^{\alpha}$$

$$(R) \quad P = \sum_{\alpha} D^{\alpha} b_{\alpha} \quad \Rightarrow \quad P = P_a \text{ mit } a(x, y, \xi) = \sum_{\alpha} b_{\alpha}(y) \xi^{\alpha}$$

Hierbei ist b_{α} als Multiplikationsoperator mit der Funktion b_{α} zu verstehen, also $D^{\alpha} b_{\alpha}$ als der Operator $u \mapsto D^{\alpha}(b_{\alpha} u)$. (R) folgt aus folgender Rechnung:

$$\begin{aligned} D^{\alpha}(b_{\alpha} u) &= \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(D^{\alpha}(b_{\alpha} u))) = \mathcal{F}^{-1}(\xi^{\alpha} \mathcal{F}(b_{\alpha} u)) = \\ &= \int e^{ix\xi} \xi^{\alpha} \underbrace{\mathcal{F}(b_{\alpha} u)(\xi)}_{= \int e^{-iy\xi} b_{\alpha}(y) u(y) dy} d\xi = \int \int e^{i(x-y)\xi} \xi^{\alpha} b_{\alpha}(y) u(y) dy d\xi. \end{aligned}$$

d.h. $D^{\alpha} b_{\alpha}$ hat Amplitude $\xi^{\alpha} b_{\alpha}(y) = b_{\alpha}(y) \xi^{\alpha}$. Allgemeiner:

$$P = \sum_{\alpha} a_{\alpha} D^{\alpha} b_{\alpha} \quad \Rightarrow \quad P = P_a \text{ mit } a(x, y, \xi) = \sum_{\alpha} a_{\alpha}(x) b_{\alpha}(y) \xi^{\alpha}.$$

Mit der Produktregel kann dies in die Form (L) (oder auch (R)) umgeschrieben werden:

$$Pu = \sum_{\alpha} a_{\alpha} D^{\alpha}(b_{\alpha} u) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (D^{\alpha-\beta} b_{\alpha}) D^{\beta} u = \sum_{\beta} c_{\beta} D^{\beta}$$

für geeignete c_{β} . (Hierbei ist $D^{\alpha-\beta} b_{\alpha}$ die Ableitung der Funktion b_{α} , also kein Operator!)

Wir sehen: Für denselben Operator gibt es viele verschiedene Amplituden a mit $P = P_a$. In anderer Weise zeigte dies bereits Proposition 22.

Der Reduktionssatz

Folgender Satz zeigt, dass die Reduktion auf die Form (L) auch für Ψ DOs geht (bis auf glättende Fehler), und gibt eine kompakte Formel an.

Satz 27. Für jeden $\Psi DO P \in \Psi^m(\Omega)$ gibt es ein $p \in S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$ mit $P \equiv P_p \pmod{\Psi^{-\infty}(\Omega)}$, wobei p als Amplitude $p(x, \xi)$ aufgefasst wird. p ist durch P eindeutig $\pmod{S^{-\infty}}$ bestimmt.

Ist $P = P_a$ mit $a \in S^m(\Omega \times \Omega, \mathbb{R}^n)$, so lässt sich p wie folgt berechnen:

$$p(x, \xi) \sim \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n} \frac{1}{\alpha!} \underbrace{(\partial_y^\alpha D_\xi^\alpha a(x, y, \xi))}_{\in S^{m-|\alpha|}} \Big|_{y=x} \quad (32)$$

Man nennt p das **Symbol** von P und schreibt $p = \sigma(P)$.

Manchmal schreibt man auch σ_P oder $\sigma_L(P)$ (Linkssymbol, s. unten). Da p nicht eindeutig durch P festgelegt ist, sollte man genauer das Symbol von P als die Äquivalenzklasse $[p] = p + S^{-\infty}$ definieren, also als Element des Quotientenraums $S^m/S^{-\infty}$. Wie auch bei den L^1 -Räumen (integrierbare Funktionen) üblich, schreiben wir trotzdem p statt $[p]$.⁷

Die asymptotische Summe (32) ist definiert, da es für jedes j nur endlich viele α mit $|\alpha| = j$ gibt. Die ersten Terme sind

$$p(x, \xi) \sim a(x, y, \xi) + \frac{1}{i} \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial y_j} \frac{\partial}{\partial \xi_j} a(x, y, \xi) \Big|_{y=x} + \dots$$

Beweis (von Satz 27): Existenz von p : Für festes x, ξ verwende die Taylorentwicklung der Funktion $y \mapsto a(x, y, \xi)$ um den Punkt $y = x$:

$$a(x, y, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq N-1} \frac{1}{\alpha!} (y-x)^\alpha \partial_y^\alpha a \Big|_{y=x} + R_N(x, y, \xi).$$

Nach Proposition 22 ist $P_{(y-x)^\alpha b} = P_{D_\xi^\alpha b}$ für beliebige Amplituden b . Wenden wir dies auf $b(x, \xi) = \frac{1}{\alpha!} (\partial_y^\alpha a(x, y, \xi)) \Big|_{y=x}$ an, so folgt mit

$$p_\alpha(x, \xi) := \frac{1}{\alpha!} (D_\xi^\alpha \partial_y^\alpha a(x, y, \xi)) \Big|_{y=x},$$

dass

$$P_a = P_{\sum_{|\alpha| \leq N-1} p_\alpha} + P_{R_N}.$$

Denn die Zuordnung $a \mapsto P_a$ ist offenbar linear. Am Ende dieses Beweises zeigen wir $P_{R_N} \in \Psi^{m-N}$. Wählt man nun p mit (vgl. Satz 25)

$$p(x, \xi) \sim \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n} p_\alpha(x, \xi),$$

das heißt $R'_N := p - \sum_{|\alpha| \leq N-1} p_\alpha \in S^{m-N} \forall N$, so folgt

$$P_p - P_a = P_{p - \sum_{|\alpha| \leq N-1} p_\alpha} - P_{a - \sum_{|\alpha| \leq N-1} p_\alpha} = P_{R'_N} - P_{R_N} \in \Psi^{m-N}$$

für alle N , also $P_p - P_a \in \Psi^{-\infty}(\Omega)$. Damit ist die Existenz von p bewiesen.

Eindeutigkeit von p modulo $S^{-\infty}$: Für $p = p(x, \xi)$ folgt für den Schwartz Kern aus (23)

$$K_p(x, y) = \check{p}(x, x-y) \quad (33)$$

wobei $\check{p}(x, z) = \int e^{iz\xi} p(x, \xi) d\xi$ die inverse Fouriertransformation bzgl. ξ ist. Ist nun $P_p \equiv P_{p'} \pmod{\Psi^{-\infty}}$, so ist für $r = p - p'$ der Kern K_r glatt, also $\check{r}(x, z)$ glatt bei $z = 0$. Aus Satz 16c), angewendet mit lokal gleichmäßiger C^∞ -Abhängigkeit vom Parameter x , folgt, dass $r \in S^{-\infty}$.

⁷Unter einer Zusatzbedingung an P – eigentlich getragen, siehe Definition 31 – kann man P einen kanonischen Vertreter dieser Äquivalenzklasse zuordnen. Siehe z.B. Shubin oder Folland. Dies ist jedoch für die lokale Theorie nicht sinnvoll, da es eine Eindeutigkeit suggeriert, die keine Bedeutung hat.

Wir müssen noch $P_{R_N} \in \Psi^{m-N}$ zeigen. Die Idee hierfür ist, die Formel für das Restglied⁸

$$R_N(x, y, \xi) = N \sum_{|\alpha|=N} \frac{1}{\alpha!} (y-x)^\alpha \int_0^1 (1-s)^{N-1} (\partial_y^\alpha a)(x, x+s(y-x), \xi) ds \quad (34)$$

zu verwenden. Das Integral definiert für jedes α ein Element von S^m , da die Symbolabschätzungen lokal gleichmäßig in x, y gelten. Zwar ist R_N selbst nicht in S^{m-N} , aber durch das Umwandeln der $(y-x)^\alpha$ -Faktoren in D_ξ^α wie oben sehen wir, dass es ein $R_N'' \in S^{m-N}$ gibt mit $K_{R_N}(x, y) = K_{R_N''}(x, y)$. Damit sind wir fast fertig. Wir müssen noch beachten, dass (34) nur gilt, wenn die Strecke von x nach y ganz in Ω liegt, denn $x+s(y-x)$ durchläuft diese Strecke. Wählt man für jedes $x \in \Omega$ ein $r_x > 0$ mit $B_{r_x}(x) \subset \Omega$, so gilt (34) immerhin in der Umgebung $U = \{(x, y) : x \in \Omega, y \in B_{r_x}(x)\}$ von Diag_Ω , somit gilt dort $K_{R_N}(x, y) = K_{R_N''}(x, y)$. Mit Hilfe einer Abschneidefunktion ρ mit Träger in U , die gleich 1 in einer kleineren Umgebung von Diag_Ω ist, schreiben wir schließlich $K_{R_N} = \rho K_{R_N''} + (1-\rho)K_{R_N}$. Der erste Term liefert einen Operator in Ψ^{m-N} , der zweite einen glättenden Operator wegen Satz 20. \square

Lemma 28. *Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen und $U \subset \Omega \times \Omega$ eine offene Umgebung von Diag_Ω . Dann gibt es eine Funktion $\rho \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$ mit Träger in U , die in einer kleineren Umgebung von Diag_Ω gleich eins ist.*

Beweis als Übung.

Bedeutung des Symbols

Das Symbol p eines Ψ DOs P beschreibt genau die Singularität des Kerns K von P bei Diag_Ω : Denn $K \equiv K_p \pmod{C^\infty}$, und nach (33) ist $K_p(x, y) = \check{p}(x, x-y)$, mit \check{p} die inverse Fouriertransformation bzgl. ξ . Das heißt, wenn man K_p für festes x als Funktion von $z = x-y$ auffasst, so beschreibt das Verhalten von $p(x, \xi)$ für $\xi \rightarrow \infty$ die Singularität von $K_p(x, y) = K_p(x, x-z)$ bei $z = 0$.

Operator und Symbol bestimmen einander in folgendem Sinn eindeutig:

Satz 29. *Die Zuordnung $p \mapsto P_p$ definiert einen Isomorphismus, für jedes $m \in \mathbb{R}$,*

$$S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)/S^{-\infty}(\Omega, \mathbb{R}^n) \rightarrow \Psi^m(\Omega)/\Psi^{-\infty}(\Omega). \quad (35)$$

Beweis: Offenbar ist $p \mapsto P_p, S^m \rightarrow \Psi^m$ linear. Verknüpft man dies mit der natürlichen Projektion $\Psi^m \rightarrow \Psi^m/\Psi^{-\infty}$, erhält man die Abbildung $S^m \rightarrow \Psi^m/\Psi^{-\infty}$. Diese ist surjektiv nach Satz 27. Es bleibt zu zeigen, dass der Kern dieser Abbildung $S^{-\infty}$ ist. Ein Symbol p liegt in diesem Kern genau dann, wenn $P_p \in \Psi^{-\infty}$, also K_p glatt ist. Ist $K_p = \check{p}(x, x-y)$ glatt, so ist $D_x^\alpha \check{p}(x, z)$ glatt als Funktion von z , lokal gleichmäßig in x und für jedes α , also folgt $p \in S^{-\infty}$ nach Satz 16c). \square

Formel für das Symbol des adjungierten Operators

Nach Satz 21 ist das Adjungierte $(P_a)^*$ eines Ψ DO der Ψ DO mit Amplitude $a^*(x, y, \xi) = \overline{a(y, x, \xi)}$. Wenn $a(x, y, \xi) = p(x, \xi)$ nur von x, ξ abhängt (also das Symbol von P_a ist), ist $a^*(x, y, \xi) = \overline{p(y, \xi)}$ eine Funktion von y, ξ . Im Fall von Differentialoperatoren ist das leicht zu verstehen: Aus $D^* = D$ (partielle Integration und $\bar{i} = -i$) und $(AB)^* = B^*A^*$ folgt

$$P = \sum_{\alpha} a_{\alpha} D^{\alpha} \Rightarrow P^* = \sum_{\alpha} D^{\alpha} \overline{a_{\alpha}},$$

und dies hat Amplitude $\sum_{\alpha} \overline{a_{\alpha}}(y) \xi^{\alpha}$. Man kann $\overline{p(y, \xi)}$ wieder in ein x, ξ -Symbol 'umwandeln' und erhält:

⁸Dies folgt aus der eindimensionalen Taylorformel

$$f(t) = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{t^j}{j!} f^{(j)}(0) + \frac{t^N}{(N-1)!} \int_0^1 (1-s)^{N-1} f^{(N)}(ts) ds$$

wenn man $f(t) = a(x, x+t(y-x), \xi)$ setzt und bei $t = 1$ auswertet.

Satz 30. $P \in \Psi^m$ habe das Symbol p . Dann hat $P^* \in \Psi^m$ das Symbol

$$q(x, \xi) \sim \sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} \partial_x^{\alpha} \overline{D_{\xi}^{\alpha} p(x, \xi)}. \quad (36)$$

Beweis: Nach den vorhergehenden Bemerkungen und Satz 27 hat P^* das Symbol

$$\sum \frac{1}{\alpha!} \partial_y^{\alpha} \overline{D_{\xi}^{\alpha} p(y, \xi)}|_{y=x} \quad \square$$

Links- und Rechtssymbol

Nach Satz 27 hat jedes $P \in \Psi^m(\Omega)$ ein $\text{mod } S^{-\infty}$ eindeutiges Symbol $p(x, \xi)$, auch Links-Symbol von P genannt und mit $\sigma_L(P)$ bezeichnet. Analog kann man P durch eine Amplitude darstellen, die nur von y und ξ abhängt, und diese ist wieder $\text{mod } S^{-\infty}$ eindeutig. Man nennt diese Rechtssymbol von P , Bezeichnung $\sigma_R(P)$.

Dies folgt direkt aus den Überlegungen zur Adjungierten, die auch eine Formel liefern:

$$\sigma_R(P) = \overline{\sigma_L(P^*)} \quad (37)$$

III.7 Komposition von Ψ DOs

Für Differentialoperatoren gilt offenbar

$$P \in \text{Diff}^m(\Omega), Q \in \text{Diff}^l(\Omega) \Rightarrow P \circ Q \in \text{Diff}^{m+l}(\Omega).$$

Unser Ziel ist es, dies auf Ψ DOs verallgemeinern, d.h. überall Diff durch Ψ ersetzen.

Eigentlich getragene Operatoren

Zunächst müssen wir uns um ein kleines Problem kümmern⁹: Ψ DOs bilden wie folgt ab:

$$\begin{aligned} P &: C_0^{\infty}(\Omega) \rightarrow C^{\infty}(\Omega) \\ Q &: C_0^{\infty}(\Omega) \rightarrow C^{\infty}(\Omega), \end{aligned}$$

also ist für $u \in C_0^{\infty}(\Omega)$ nur $Qu \in C^{\infty}(\Omega)$ (nicht $C_0^{\infty}(\Omega)$) und somit $P(Qu)$ nicht definiert¹⁰. Wir formulieren nun eine Bedingung, unter der die Komposition $P \circ Q$ definiert ist.

Dazu definieren wir zunächst die beiden Projektionen

$$\pi_1, \pi_2 : \Omega \times \Omega \rightarrow \Omega, \quad \pi_1(x, y) = x, \quad \pi_2(x, y) = y$$

und erinnern an folgenden topologischen Begriff:

Definition 31. Seien X, Y topologische (z.B. metrische) Räume. $f : X \rightarrow Y$ heißt **eigentlich**¹¹, falls $f^{-1}(\text{kompakt}) = \text{kompakt}$, d.h. $\forall K' \subseteq Y$ gilt: $f^{-1}(K') \subseteq X$.

Zur Erinnerung: Wenn f stetig ist, gilt $f(\text{kompakt}) = \text{kompakt}$ und $f^{-1}(\text{offen}) = \text{offen}$ sowie $f^{-1}(\text{abgeschlossen}) = \text{abgeschlossen}$. Jedoch muss ein stetiges f nicht eigentlich sein, z.B. sind für offenes $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ die Projektionen $\pi_{1,2}$ stetig, aber nicht eigentlich, da z.B. $(\pi_1)^{-1}(\{x_0\}) = \{x_0\} \times \Omega$ nicht kompakt ist ($x_0 \in \Omega$ beliebig).

Falls X kompakt ist, so ist jedoch jede stetige Abbildung $f : X \rightarrow Y$ eigentlich, denn $K' \subset Y$ kompakt $\Rightarrow K'$ abgeschlossen $\Rightarrow f^{-1}(K')$ abgeschlossen $\Rightarrow f^{-1}(K')$ kompakt, da abgeschlossene Teilmengen kompakter Mengen wieder kompakt sind.

⁹auch wenn dies im Vergleich eher nebensächlich ist

¹⁰Konkret bedeutet dies, dass schon das y -Integral in (22) möglicherweise nicht konvergiert.

¹¹englisch: proper

Definition 32. $K \subseteq \mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$ heißt **eigentlich getragen**¹², falls die Einschränkungen der Projektionen

$$\pi_1, \pi_2 : \text{supp } K \rightarrow \Omega$$

eigentlich sind. Ein stetiger Operator $P : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ heißt **eigentlich getragen**, wenn sein Schwartz Kern es ist.

Mit anderen Worten, für kompakte Mengen $K' \subseteq \Omega$ muss $\text{supp } K \cap (\pi_{1,2})^{-1}(K')$ kompakt sein. Beispiele:

- $\text{supp } K$ kompakt $\Rightarrow K$ eigentlich getragen
- Sei $\Omega = \mathbb{R}^n$ und $K(x, y) = \rho(x - y)$, $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, dann ist $\text{supp } K$ nicht kompakt aber K eigentlich getragen.

Proposition 33. Ist $P \in \Psi^m(\Omega)$ eigentlich getragen, dann bildet P stetig ab:

$$\begin{aligned} C_0^\infty(\Omega) &\rightarrow C_0^\infty(\Omega) \\ \mathcal{E}'(\Omega) &\rightarrow \mathcal{E}'(\Omega) \\ C^\infty(\Omega) &\rightarrow C^\infty(\Omega) \\ \mathcal{D}'(\Omega) &\rightarrow \mathcal{D}'(\Omega). \end{aligned}$$

Beweis: Sei $u \in C_0^\infty(\Omega)$ und sei K der Kern von P . Es gilt

$$\text{supp } Pu \subset \text{supp } K \circ \text{supp } u = \pi_1(\text{supp } K \cap \pi_2^{-1}(\text{supp } u)) \quad (38)$$

und $\text{supp } K \cap \pi_2^{-1}(\text{supp } u)$ ist kompakt, da $\text{supp } u$ kompakt und K eigentlich getragen. Also ist $Pu \in C_0^\infty(\Omega)$, d.h. $P : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C_0^\infty(\Omega)$. Außerdem ist $P : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C_0^\infty(\Omega)$ stetig (Übung). Offenbar ist mit P auch P^t eigentlich getragen. Also $P^t : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C_0^\infty(\Omega)$, und mittels Dualität folgt $P : \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$.

Da (38) auch für Distributionen gilt, zeigt dasselbe Argument $P : \mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{E}'(\Omega)$, dann $P : C^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ mit Dualität. \square

Wir können also festhalten: Sind P, Q Ψ DOs und einer davon ist eigentlich getragen, so ist $P \circ Q : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ definiert, denn:

- P eigentlich getragen: $C_0^\infty(\Omega) \xrightarrow{Q} C^\infty(\Omega) \xrightarrow{P} C^\infty(\Omega)$
- Q eigentlich getragen: $C_0^\infty(\Omega) \xrightarrow{Q} C_0^\infty(\Omega) \xrightarrow{P} C^\infty(\Omega)$

Die Kompositionsformel

Satz 34. Sei $P \in \Psi^m(\Omega)$, $Q \in \Psi^l(\Omega)$, mindestens einer von P, Q sei eigentlich getragen. Dann ist $P \circ Q \in \Psi^{m+l}(\Omega)$. Sind p, q die Symbole von P, Q , so ist das Symbol $p\#q$ von $P \circ Q$

$$\begin{aligned} (p\#q)(x, \xi) &\sim \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n} \frac{1}{\alpha!} D_\xi^\alpha p(x, \xi) \partial_x^\alpha q(x, \xi) = \\ &= \underbrace{p(x, \xi)q(x, \xi)}_{S^{m+l}} + \sum_j \underbrace{D_{\xi_j} p(x, \xi) \partial_{x_j} q(x, \xi)}_{S^{m+l-1}} + \dots \end{aligned} \quad (39)$$

Beweis: Die Komposition $P \circ Q$ direkt auszurechnen ist nicht ganz einfach, denn:

$$\begin{aligned} (Pu)(x) &= \int e^{ix\xi} p(x, \xi) \hat{u}(\xi) \bar{d}\xi = \int \int e^{i(x-y)\xi} p(x, \xi) u(y) dy \bar{d}\xi, \\ (Qf)(y) &= \int e^{iy\eta} q(y, \eta) \hat{f}(\eta) \bar{d}\eta = \int \int e^{i(y-z)\eta} q(y, \eta) f(z) dz \bar{d}\eta, \quad \text{also} \\ ((PQ)f)(x) &= P(Qf)(x) = \int \int \int e^{i[(x-y)\xi + (y-z)\eta]} p(x, \xi) q(y, \eta) f(z) dz \bar{d}\eta dy \bar{d}\xi. \end{aligned}$$

¹²englisch: properly supported

Um solche Vierfach-Integrale zu vermeiden, verwenden wir folgenden Trick: Wir schreiben Q mittels eines Rechts-Symbols:

$$(Qf)(y) = \int e^{i(y-z)\eta} q_R(z, \eta) f(z) dz d\eta = \int e^{iy\eta} \underbrace{\left[\int e^{-iz\eta} q_R(z, \eta) f(z) dz \right]}_{\text{unabh. von } y, \text{ Fkt. von } \eta} d\eta.$$

(Wir ignorieren zunächst die Tatsache, dass P und Q nur bis auf glättende Restterme durch ihr Links- bzw. Rechtssymbol dargestellt werden können. Dazu siehe das Ende des Beweises.) Also ist Qf die inverse Fouriertransformierte der Funktion in den eckigen Klammern. Daher

$$\widehat{Qf}(\eta) = \int e^{-iz\eta} q_R(z, \eta) f(z) dz.$$

Wir setzen $u = Qf$ in P ein:

$$(P(Qf))(x) = \int e^{ix\xi} p(x, \xi) \widehat{Qf}(\xi) d\xi = \int e^{ix\xi} p(x, \xi) \int e^{-iz\xi} q_R(z, \xi) f(z) dz d\xi$$

und ersetzen z durch y und erhalten:

$$(PQf)(x) = \int \int e^{i(x-y)\xi} \underbrace{p(x, \xi) q_R(y, \xi)}_{a(x, y, \xi)} f(y) dy d\xi.$$

Also: PQ ist Ψ DO mit Amplitude $a(x, y, \xi) = p(x, \xi) q_R(y, \xi)$. Dies zeigt $PQ \in \Psi^{m+l}(\Omega)$. Wir berechnen das Symbol von PQ :

$$\begin{aligned} q_R(y, \xi) &= \sigma_R(Q) = \overline{\sigma_L(Q^*)} \sim \sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} \overline{\partial_y^\alpha D_\xi^\alpha q(y, \xi)}, \quad \text{also} \\ q_R(y, \xi) &\sim \sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} \partial_y^\alpha (-D_\xi)^\alpha q(y, \xi) = e^{-\langle \partial_y, D_\xi \rangle} q(y, \xi), \end{aligned}$$

wobei $-\langle \partial_y, D_\xi \rangle := \sum_{j=1}^n -\partial_{y_j} D_{\xi_j}$. Hierbei ist die e -Funktion als Kurznotation für ihre Potenzreihe zu verstehen.¹³

Mit derselben Kurznotation können wir schreiben:

$$\begin{aligned} \sigma_L(PQ)(x, \xi) &= \sum_{\alpha} \frac{1}{\alpha!} \partial_y^\alpha D_\xi^\alpha a(x, y, \xi)|_{y=x} = [e^{\langle \partial_y, D_\xi \rangle} a(x, y, \xi)]|_{y=x}, \quad \text{also} \\ \sigma_L(PQ)(x, \xi) &= [e^{\langle \partial_y, D_\xi \rangle} (p(x, \xi) e^{-\langle \partial_y, D_\xi \rangle} q(y, \xi))] |_{y=x} \end{aligned} \quad (40)$$

In (40) würden wir gerne die “ e -Funktionen zusammenfassen“. Dies lässt sich wegen der Produktregel nicht direkt machen, weil $p(x, \xi)$ von ξ abhängt. Deshalb wenden wir einen Trick an und “entzerren“ durch Einführen einer zusätzlichen Variable τ : Für Funktionen h gilt $D_\xi h(\xi) = D_\tau h(\xi + \tau)|_{\tau=0}$. Daher

$$e^{-\langle \partial_y, D_\xi \rangle} q(y, \xi) = e^{-\langle \partial_y, D_\tau \rangle} q(y, \xi + \tau)|_{\tau=0}$$

Dann wird aus dem Ausdruck in (40):

$$\begin{aligned} &= [e^{\langle \partial_y, D_\xi \rangle} (p(x, \xi) e^{-\langle \partial_y, D_\tau \rangle} q(y, \xi + \tau))] |_{y=x, \tau=0} = \\ &= [e^{\langle \partial_y, D_\xi \rangle} e^{-\langle \partial_y, D_\tau \rangle} (p(x, \xi) q(y, \xi + \tau))] |_{y=x, \tau=0} = \\ &= [e^{\langle \partial_y, D_\xi - D_\tau \rangle} (p(x, \xi) q(y, \xi + \tau))] |_{y=x, \tau=0}. \end{aligned} \quad (41)$$

¹³Rechtfertigung dieser Kurznotation: Für $t \in \mathbb{R}$ ist $e^t = \sum_{\alpha=0}^{\infty} \frac{1}{\alpha!} t^\alpha$, also für $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$

$$e^{\sum_{j=1}^n t_j} = \prod_{j=1}^n e^{t_j} = \prod_{j=1}^n \sum_{\alpha_j=0}^{\infty} \frac{1}{\alpha_j!} t_j^{\alpha_j} = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n} \frac{1}{\alpha!} t^\alpha$$

Dies kann als Identität formaler Potenzreihen interpretiert werden. Setze nun $t_j = -\partial_{y_j} D_{\xi_j}$.

Wir wollen nun verwenden, dass $(D_\xi - D_\tau)^\alpha q(y, \xi + \tau) = 0$. Dazu führen wir den Variablenwechsel $(\xi, \tau) \mapsto (\tilde{\xi}, \zeta)$ mit $\tilde{\xi} := \xi$ und $\zeta := \xi + \tau$ durch, womit

$$\begin{aligned} iD_\xi &= \frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial \tilde{\xi}}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial \tilde{\xi}} + \frac{\partial \zeta}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial \zeta} = \frac{\partial}{\partial \tilde{\xi}} + \frac{\partial}{\partial \zeta} = i(D_{\tilde{\xi}} + D_\zeta), \\ iD_\tau &= \frac{\partial}{\partial \tau} = \frac{\partial \tilde{\xi}}{\partial \tau} \frac{\partial}{\partial \tilde{\xi}} + \frac{\partial \zeta}{\partial \tau} \frac{\partial}{\partial \zeta} = 0 + \frac{\partial}{\partial \zeta} = iD_\zeta \end{aligned}$$

folgt. Also ist $D_\xi - D_\tau = D_{\tilde{\xi}}$ und somit wird aus dem Ausdruck in (41):

$$= \left[e^{\langle \partial_y, D_{\tilde{\xi}} \rangle} \left(p(x, \tilde{\xi}) q(y, \zeta) \right) \right]_{\zeta = \tilde{\xi}, y = x}$$

und wenn wir die “e-Funktion“ wieder in eine Summe umschreiben, erhalten wir den Ausdruck (39) im Satz.

Im Beweis oben haben wir $P = P_p$, $Q = P_{q_R}$ angenommen. Im Allgemeinen wissen wir jedoch nur $P = P_p + R$, $Q = P_{q_R} + R'$ mit $R, R' \in \Psi^{-\infty}(\Omega)$. Nun gilt aber

$$PQ = P_p P_{q_R} + R P_{q_R} + P_p R' + R R' \quad (42)$$

und alle drei Summanden mit R oder R' sind glättend. Allerdings müssen wir noch sicherstellen, dass jedes der Produkte definiert ist, d.h. dass in jedem mindestens ein Faktor eigentlich getragen ist. Damit wäre der Beweis oben gerettet.

Sei P eigentlich getragen. Folgendes Lemma zeigt, dass p so gewählt werden kann, dass auch P_p eigentlich getragen ist (für beliebiges p stimmt das nicht). Dann ist auch R eigentlich getragen, und damit sind alle Terme in (42) definiert. Ähnlich können wir im Fall argumentieren, dass Q eigentlich getragen ist. \square

Folgendes Lemma ist nur für das technische Detail am Ende des vorigen Beweises wichtig.

Lemma 35. *Sei $p_0 \in S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Dann gibt es ein $p \in S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$ mit $p \equiv p_0 \pmod{S^{-\infty}}$, für das P_p eigentlich getragen ist.*

Beweis: Idee: Wir verwenden die Formel $K_{p_0}(x, y) = \check{p}_0(x, x - y)$. Dies schneiden wir nahe der Diagonalen ab, so dass das Resultat eigentlich getragen ist, und bestimmen ein Symbol p , für das K_p genau dieses Resultat ist.

Genauer: Wähle eine eigentlich getragene Funktion $\rho_0 \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$, die in einer Umgebung der Diagonale gleich eins ist. Setze $\rho(x, z) = \rho_0(x, x - z)$, so dass $\rho(x, x - y) = \rho_0(x, y)$. Da ρ_0 eigentlich getragen ist, hat die Funktion $z \mapsto \rho(x, z)$ für jedes x kompakten Träger und ist für $z \in \mathbb{R}^n$ definiert und glatt. Sei $\hat{\rho}(x, \xi)$ die Fouriertransformation bzgl. der z -Variablen. Sei nun p_0 ein beliebiges Symbol von P und setze

$$p(x, \xi) = \int \hat{\rho}(x, \eta) p_0(x, \xi - \eta) d\eta,$$

d.h. die Faltung bzgl. der ξ -Variablen. Dann ist $\check{p}(x, z) = \rho(x, z) \check{p}_0(x, z)$, also $K_p(x, y) = \check{p}(x, x - y) = \rho_0(x, y) \check{p}_0(x, x - y)$. Da ρ_0 eigentlich getragen ist, gilt dasselbe für K_p .

Es bleibt nachzuprüfen, dass $p \in S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Übung! (Verwende, dass $\hat{\rho}(x, \eta)$ für $\eta \rightarrow \infty$ schnell abfällt.)

Schließlich ist $K_p - K_{p_0} = 0$ in einer Umgebung der Diagonalen, also glatt, und daher ist $p \equiv p_0 \pmod{S^{-\infty}}$.¹⁴ \square

¹⁴Eine andere Konstruktion, die zu einem kompakt getragenen Operator P ein Symbol p mit $P = P_p$ konstruiert, ist folgende: Setze $p(x, \xi) = e^{-ix\xi} (P e_\xi)(x)$, wobei $e_\xi(x) = e^{ix\xi}$. Es ist formal leicht zu zeigen, dass $P = P_p$. Jedoch ist es etwas schwieriger nachzuprüfen, dass p ein Symbol ist. Siehe Shubin oder Folland.

III.8 Hauptsymbol, klassische Operatoren

Die Kompositionsformel (39) zeigt, dass das Symbol der Komposition zweier Ψ DOs bis auf Terme niedrigerer Ordnung gleich dem Produkt der Symbole der beiden Operatoren ist. Dies motiviert folgende Definition.

Definition 36. Sei $P \in \Psi^m(\Omega)$ und p ein Symbol für P . Das **Hauptsymbol** von P ist die Äquivalenzklasse von p in

$$S^m(\Omega, \mathbb{R}^n) / S^{m-1}(\Omega, \mathbb{R}^n) \quad (\text{Quotientenraum})$$

und wird mit $\sigma_m(P)$ bezeichnet.

Offenbar ist dies wohldefiniert, da p modulo $S^{-\infty}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ eindeutig durch P festgelegt ist.¹⁵ Wir schreiben $\sigma_m(P) = [p]$, wobei die eckigen Klammern die Äquivalenzklasse zum Ausdruck bringen. Der folgende Satz zeigt, dass sich mit Hauptsymbolen viel leichter rechnen lässt als mit den vollständigen Symbolen.

Satz 37. Seien $P \in \Psi^m(\Omega)$, $Q \in \Psi^l(\Omega)$. Dann gilt

- a) $\sigma_{m+l}(P \circ Q) = \sigma_m(P)\sigma_l(Q)$
- b) $\sigma_m(P^*) = \overline{\sigma_m(P)}$
- c) $\sigma_m(P) = [\sigma_L(P)] = [\sigma_R(P)]$

In c) ist $\sigma_L(P)$ das Linkssymbol (= das Symbol) und $\sigma_R(P)$ das Rechtssymbol von P .

Beweis: Dies folgt direkt aus den Formeln (39), (36) und (37). □

Eine wichtige Teilklasse der Ψ DOs sind die klassischen Ψ DOs. Sie sind dadurch charakterisiert, dass ihr Symbol sich als asymptotische Summe *positiv homogener* (bzgl. ξ) Funktionen darstellen lässt. Wir hatten bereits das Beispiel

$$\frac{1}{1 + \xi^2} \sim \xi^{-2} - \xi^{-4} + \dots \quad (43)$$

gesehen, bei dem der Term ξ^{-2j} homogen vom Grad $-2j$ ist. Streng genommen haben wir diese asymptotische Summe noch nicht definiert, da die Funktionen ξ^{-2j} keine Symbole sind, da sie in $\xi = 0$ nicht glatt sind. Da es aber für Symbole nur auf das Verhalten für $|\xi| \rightarrow \infty$ ankommt, verwenden wir auch die Schreibweise (43) und meinen streng genommen $\frac{1}{1+\xi^2} \sim \xi^{-2}\chi(\xi) - \xi^{-4}\chi(\xi) + \dots$, mit unserer üblichen Abschneidefunktion χ .

Definition 38. Ein Symbol $p \in S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$ heißt **klassisch (oder polyhomogen)**, falls es $p_j \in C^\infty(\Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus 0))$ gibt mit

- a) $p \sim \sum_{j=0}^{\infty} p_j$
- b) p_j ist positiv homogen in ξ vom Grad $m - j$, d.h.

$$p_j(x, t\xi) = t^{m-j} p_j(x, \xi) \text{ für alle } t > 0, x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n \setminus 0.$$

Ein Operator $P \in \Psi^m(\Omega)$ heißt **klassisch**, wenn sein Symbol klassisch ist.

Die Menge der klassischen Symbole bzw. Operatoren bezeichnen wir mit $S_{\text{cl}}^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$ bzw. $\Psi_{\text{cl}}^m(\Omega)$.

Beispiele:

- Sei p ein Polynom bzgl. ξ , dann ist p ein klassisches Symbol: Für $p(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \xi^\alpha$ setze $p_j(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=m-j} a_\alpha(x) \xi^\alpha$.
- $p(\xi) = |\xi|\chi(\xi)$ ist klassisch, aber kein Polynom. Hier ist $p_0(\xi) = |\xi|$.
- Siehe (43). Hier sind die p_j sogar homogen, nicht bloss positiv homogen.

¹⁵Genau genommen sollte man ‚Hauptsymbol der Ordnung m ‘ sagen, da man $P \in \Psi^m(\Omega)$ auch als Element von $\Psi^{m+1}(\Omega)$ betrachten könnte. Sein Hauptsymbol der Ordnung $m + 1$ wäre dann Null.

Bemerkungen:

- Die meisten real vorkommenden Operatoren sind klassisch.
- Die gesamte bisherige Theorie funktioniert für klassische Symbole und Operatoren: Z.B. $P = P_a$ mit $a \in S^m(\Omega \times \Omega, \mathbb{R}^n)$ klassisch, dann existiert ein klassisches $p = p(x, \xi)$ und $P \equiv P_p \text{ mod } \Psi^{-\infty}$.

Ein Vorteil klassischer Operatoren ist, dass der Quotientenraum in der Definition des Hauptsymbols durch einen konkreten Funktionenraum ersetzt werden kann:

Lemma und Definition 39. Sei

$$S_{\text{cl}}^{[m]}(\Omega, \mathbb{R}^n) = \{p \in C^\infty(\Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\})) : p \text{ ist positiv homogen vom Grad } m \text{ bzgl. } \xi\}$$

Dann definiert $p \mapsto [p \cdot \chi(\xi)]$ einen Isomorphismus

$$S_{\text{cl}}^{[m]}(\Omega, \mathbb{R}^n) \cong S_{\text{cl}}^m(\Omega, \mathbb{R}^n) / S_{\text{cl}}^{m-1}(\Omega, \mathbb{R}^n). \quad (44)$$

Ist $P \in \Psi_{\text{cl}}^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$, so nennen wir das entsprechende Element von $S_{\text{cl}}^{[m]}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ das **Hauptsymbol** von P .

Mit anderen Worten, hat P ein Symbol wie in Definition 38, so nennen wir den führenden Term p_0 sein Hauptsymbol.

Beweis: Es ist nur nachzuprüfen, dass die Abbildung (44) wohldefiniert und bijektiv ist. Sie ist wohldefiniert, da für eine anderes $\tilde{\chi}$ die Differenz $p\chi - p\tilde{\chi} = p(\chi - \tilde{\chi})$ kompakt getragen in ξ , also in $S^{-\infty} \subset S_{\text{cl}}^{m-1}$ ist. Bijektivität als Übung. \square

Beispiele:

- $P = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha$ hat Hauptsymbol $\sigma_m(P) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x) \xi^\alpha$.
- $P = (-\Delta + 1)^{-1}$ auf \mathbb{R}^n hat Symbol $\frac{1}{|\xi|^2+1}$ und Hauptsymbol $|\xi|^{-2}$.

III.9 Die Parametrixkonstruktion für elliptische Operatoren

Definition 40. $P \in \Psi^m(\Omega)$ heißt **elliptisch**, falls sein Hauptsymbol $\sigma_m(P)$ invertierbar ist.

Für klassisches P , bei dem man $\sigma_m(P)$ als Funktion auf $\Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ interpretieren kann, meinen wir mit Invertierbarkeit

$$\sigma_m(P)(x, \xi) \neq 0 \text{ für alle } x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

In diesem Fall folgt aus $\sigma_m(P) \in S_{\text{cl}}^{[m]}(\Omega, \mathbb{R}^n)$, dass $\frac{1}{\sigma_m(P)} \in S_{\text{cl}}^{[-m]}(\Omega, \mathbb{R}^n)$.

Beispiele:

- Δ ist elliptisch, da $\sigma_2(\Delta) = -|\xi|^2 \neq 0$ für $\xi \neq 0$.
- $\partial_t - \Delta_x$ (Wärmeleitungsoperator auf \mathbb{R}^{n+1} mit Variablen $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$) ist nicht elliptisch, denn das dazugehörige Symbol ist $i\tau + |\xi|^2$ und das Hauptsymbol $|\xi|^2$. Elliptisch würde bedeuten, dass $|\xi|^2 \neq 0$ für $(\tau, \xi) \neq 0$ und dies ist z.B. für $(1, 0) \neq 0$ nicht erfüllt.

Bemerkung: (Elliptizität für nicht-klassische Operatoren)

Invertierbarkeit von $\sigma_m(P)$ soll genauer auch im nicht-klassischen Fall bedeuten, dass es ein Inverses in $S^{[-m]} = S^{-m}/S^{-m-1}$ hat. Man sieht leicht, dass dies bedeutet, dass für ein beliebiges Symbol $p \in S^m$ von P ein $q \in S^{-m}$ existiert mit $pq \equiv 1 \text{ mod } S^{-1}$. Dies ist auch äquivalent dazu, dass es für jedes $K \subseteq \Omega$ ein $c > 0$ und $R > 0$ gibt, so dass für alle $x \in K$ gilt

$$|p(x, \xi)| \geq c|\xi|^m \text{ für } |\xi| > R.$$

(Beweis als Übung) Dies ist die Elliptizitätsbedingung, die Sie in vielen Büchern finden. \square

Definition 41. Eine **Parametrix** eines Operators $P \in \Psi^m(\Omega)$ ist ein Operator $Q \in \Psi^{-m}(\Omega)$ mit:

$$\begin{aligned} PQ &\equiv I \text{ mod } \Psi^{-\infty}, \\ QP &\equiv I \text{ mod } \Psi^{-\infty}. \end{aligned}$$

Satz 42. Jeder elliptische Operator $P \in \Psi^m(\Omega)$ hat eine Parametrix, und diese kann explizit konstruiert werden. Die Parametrix ist modulo $\Psi^{-\infty}(\Omega)$ eindeutig bestimmt.

Für klassisches P ist auch die Parametrix klassisch, wie die Konstruktion zeigen wird.

Wofür dieser Satz? Eigentlich würde man gerne ein Inverses P^{-1} konstruieren. Dieses existiert jedoch i.Allg. nicht, und selbst wenn es existiert, hat man im Fall variabler Koeffizienten meist keine Chance, es zu konstruieren. Eine Parametrix ist für viele Zwecke ein guter Ersatz. Sie hat folgende Vorteile:

- Eine Parametrix existiert immer (für elliptische Operatoren), auch wenn der Operator nicht invertierbar ist.
- Eine Parametrix kann wie folgt bestimmt werden:
 1. Zunächst bestimmt man das Symbol der Parametrix. Dies geht mit rein algebraischen Operationen und Ableitungen.
 2. Die Parametrix (genauer: ihren Schwartz Kern) erhält man aus ihrem Symbol mittels Fourier-Transformation, siehe (33).

Beweis (Die Parametrixkonstruktion): Wir geben die Konstruktion an und ergänzen am Schluss einige Details. In den Schritten 1.-3. konstruieren wir zunächst eine Rechts-Parametrix, d.h. ein Q mit $PQ \equiv I \text{ mod } \Psi^{-\infty}$.

1. Bestimme $Q_0 \in \Psi^{-m}$ mit Hauptsymbol $\sigma_{-m}(Q_0) = \frac{1}{\sigma_m(P)}$.
2. Es gilt $PQ_0 \in \Psi^0$ und $\sigma_0(PQ_0) = \sigma_m(P)\sigma_{-m}(Q_0) = 1 = \sigma_0(I)$. Daher ist $\sigma_0(PQ_0 - I) = 0$, woraus $PQ_0 - I \in \Psi^{-1}$ folgt. Also ist

$$PQ_0 = I + R_0 \text{ mit } R_0 \in \Psi^{-1}. \quad (45)$$

Also ist Q_0 immerhin schon eine ‚schwache‘ Rechts-Parametrix: Wir müssen den Fehler noch von Ψ^{-1} auf $\Psi^{-\infty}$ verbessern.¹⁶

Zu diesem Zweck würden wir gerne (45) von rechts mit $(I + R_0)^{-1}$ multiplizieren. Dieses Inverse muss aber nicht existieren. Was tun?

3. Wir verwenden die Idee der Neumannschen Reihe (= geometrische Reihe für Operatoren). Da diese aber nicht konvergieren muss, verwenden wir asymptotische Summation: Bestimme $S \in \Psi^0$ mit

$$S \sim I - R_0 + R_0^2 - \dots$$

S existiert, da $R_0 \in \Psi^{-1}$, $R_0^2 \in \Psi^{-2}$, Die asymptotische Summe bedeutet, dass man für alle N schreiben kann

$$S = I - R_0 + R_0^2 - \dots \pm R_0^{N-1} + R_N \quad \text{mit } R_N \in \Psi^{-N}$$

Setze nun $Q = Q_0 S$, dann folgt für alle N

$$\begin{aligned} PQ &= PQ_0 S = (I + R_0)S = (I + R_0)(I - R_0 + R_0^2 - \dots \pm R_0^{N-1} + R_N) \\ &= I \pm R_0^N + (I + R_0)R_N. \end{aligned}$$

Hierbei ist $\pm R_0^N + (I + R_0)R_N \in \Psi^{-N}$, also $PQ - I \in \Psi^{-N}$. Da dies für alle N gilt, folgt $PQ - I \in \Psi^{-\infty}$. Also ist $PQ = I + R$ mit $R \in \Psi^{-\infty}$.

4. Dieselbe Konstruktion, angefangen mit $Q_0 P = I + R'_0$, liefert eine Linksparemetrix $Q' \in \Psi^{-m}$, d.h. $Q'P = I + R'$ und $R' \in \Psi^{-\infty}$.

¹⁶ Q_0 ist genau der im Abschnitt ‚ Ψ DOs, Grundidee‘ angegebene Operator (dort Q genannt, R_0 wurde dort R genannt).

5. Schließlich zeigen wir, dass jede Rechtsparametrix auch gleichzeitig eine Linksparametrix ist. Zunächst gilt $Q'(PQ) = (Q'P)Q$ und

$$Q'(PQ) = Q'(I + R) = Q' + Q'R, \quad (Q'P)Q = (I + R')Q = Q + R'Q,$$

wobei $Q'R, R'Q \in \Psi^{-\infty}$. Damit folgt $Q = Q' + R''$ mit $R'' \in \Psi^{-\infty}$, und daraus folgt

$$QP = (Q' + R'')P = Q'P + R''P = I + (R' + R''P) \equiv I \pmod{\Psi^{-\infty}}$$

weil $R''P \in \Psi^{-\infty}$.

6. Das Argument im letzten Schritt beweist auch die Eindeutigkeit der Parametrix modulo $\Psi^{-\infty}$. \square

Der Beweis ruht auf folgenden Tatsachen über Ψ DOs.

- Dem Kompositionssatz und der Formel $\sigma_{m+l}(P \circ Q) = \sigma_m(P)\sigma_l(Q)$.
- Zu jedem Element $q \in S^{[-m]}$ gibt es ein $Q \in \Psi^{-m}$ mit Hauptsymbol q . (Schritt 1 mit $q = \frac{1}{\sigma_m(P)}$)
- Der Linearität der Abbildung $\sigma_0 : \Psi^0 \rightarrow S^{[0]}$. (Schritt 2)
- Ist $A \in \Psi^0$ und $\sigma_0(A) = 0$, so folgt $A \in \Psi^{-1}$. (Schritt 2 mit $A = PQ_0 - I$)
- Die asymptotische Summation für Operatoren ist definiert. (Schritt 3)

Aufbauend hierauf war der Beweis reine (einfache) Algebra.

Die algebraische Struktur hinter der Parametrixkonstruktion

Wir fassen die wesentlichen Eigenschaften des Pseudodifferentialkalküls in algebraische Begriffe. (Dieser Abschnitt kann beim ersten Lesen übersprungen werden.)

Definition 43. Eine (*assoziative*) **Algebra** A (über \mathbb{C}) ist ein \mathbb{C} -Vektorraum mit zusätzlicher Produktstruktur, d.h. einer Abbildung $A \times A \rightarrow A : (v, w) \mapsto v \cdot w$, die bilinear ist und das Assoziativgesetz erfüllt.

Beispiele:

- $A =$ die Menge der \mathbb{R} - oder \mathbb{C} -wertigen Funktionen auf einer Menge, mit Multiplikation als Produkt.
- $A =$ die Menge der linearen Operatoren auf einem Vektorraum V , mit Komposition als Produkt.
- $A =$ die Menge der $n \times n$ -Matrizen (über \mathbb{R} oder \mathbb{C}) mit Matrixprodukt. Diese ist isomorph zum vorigen Beispiel im Fall $V = \mathbb{R}^n$ bzw. \mathbb{C}^n .
- Ein bekanntes Beispiel einer *nicht-assoziativen* Algebra ist $A = \mathbb{R}^3$, mit Kreuzprodukt $(v, w) \mapsto v \times w$.
(Es gilt das Distributivgesetz, aber nicht das Assoziativgesetz, z.B. ist $e_1 \times (e_1 \times e_2) = e_1 \times e_3 = -e_2$, aber $(e_1 \times e_1) \times e_2 = 0 \times e_2 = 0$.)
- $A = \mathbb{R}^n$ mit Skalarprodukt ist keine Algebra, da das Skalarprodukt Werte in \mathbb{R} , nicht in \mathbb{R}^n hat.

Die Algebra im ersten Beispiel ist kommutativ, d.h. $v \cdot w = w \cdot v$ für alle $v, w \in A$, die anderen nicht.

Im Folgenden sind alle Algebren assoziativ, daher schreiben wir das nicht immer hin.

Die hier auftretenden Algebren haben eine weitere Struktur:

Definition 44. Eine **Filtrierung** einer Algebra A ist eine Folge von Untervektorräumen $A_m \subset A$, $m \in \mathbb{Z}$, mit folgenden Eigenschaften:

- i) $A = \bigcup_m A_m$,
- ii) $\dots \subset A_{-2} \subset A_{-1} \subset A_0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \dots$
- iii) $A_m \cdot A_{m'} \subset A_{m+m'}$.

Eine **filtrierte Algebra** ist eine Algebra zusammen mit einer gegebenen Filtrierung.

Man nennt dies auch eine \mathbb{Z} -Filtrierung. Analog gibt es \mathbb{R} -Filtrierungen (dann ist ein A_m für jedes $m \in \mathbb{R}$ gegeben, und ii) ist ersetzt durch: $A_m \subset A_{m'}$ für $m < m'$).

Beispiele:

- $A = \{\text{Polynome auf } \mathbb{R}^n\}$, $A_m = \{\text{Polynome vom Grad } \leq m\}$ mit dem üblichen Produkt.
- $A = \{\text{Differentialoperatoren auf } \Omega\}$, $A_m = \text{Diff}^m(\Omega) := \{\text{Differentialoperatoren der Ordnung } \leq m\}$ mit der Komposition von Operatoren als Produkt.

Man schreibt auch $A = \text{Diff}^*(\Omega)$ statt $A = \bigcup_m \text{Diff}^m(\Omega)$.

- $A_m = S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$, also $A = S^*(\Omega, \mathbb{R}^n)$, mit der Multiplikation als Produkt.
- $A_m = S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)/S^{-\infty}(\Omega, \mathbb{R}^n)$, also $A = S^*(\Omega, \mathbb{R}^n)/S^{-\infty}(\Omega, \mathbb{R}^n)$, mit dem Produkt $\#$, definiert durch (39).
- $A_m = \Psi_{\text{eig}}^m(\Omega)$ und $A = \Psi_{\text{eig}}^*(\Omega)$ (eigentlich getragene Ψ DOs), mit Komposition als Produkt.

In den ersten beiden Beispielen ist $A_m = \{0\}$ für $m < 0$. In den anderen Beispielen kann man $m \in \mathbb{R}$ oder $m \in \mathbb{Z}$ betrachten. Die Algebren im ersten und dritten Beispiel sind kommutativ, die anderen nicht.

Wie immer spielen auch die strukturerhaltenden Abbildungen eine wichtige Rolle:

Definition 45. Seien A, B Algebren. Eine Abbildung $F : A \rightarrow B$ heißt **Algebra-Homomorphismus**, wenn F linear und $F(v \cdot w) = F(v) \cdot F(w)$ für alle v, w . Sind A, B filtriert, so sagen wir, F ist ein **Homomorphismus filtrierter Algebren**, wenn zusätzlich $F(A_m) \subset B_m$ für alle m gilt.

Wir wollen nun das Hauptsymbol algebraisch fassen. Dazu zunächst folgender Begriff.

Definition 46. Sei A eine filtrierte Algebra. Setze $A^{[m]} := A_m/A_{m-1}$. Dann heißt $A^{gr} := \bigoplus_{m \in \mathbb{Z}} A^{[m]}$ die A zugeordnete **graduierete Algebra**.¹⁷

Man sollte sich überzeugen, dass A^{gr} tatsächlich eine Algebra ist: Um das Produkt zu definieren, reicht es, es auf einzelnen Summanden der direkten Summe zu definieren. Seien also $[a] \in A^{[m]}$, $[b] \in A^{[l]}$, d.h. die Äquivalenzklassen von Elementen $a \in A_m, b \in A_l$. Dann definiere $[a] \cdot [b] := [ab]$ (wie auch sonst?). Nachzuprüfen ist, dass dies wohldefiniert ist, d.h. dass aus $[a'] = [a], [b'] = [b]$ auch $[a'b'] = [ab]$ folgt.¹⁸

Der Sinn dieses Begriffs liegt darin, dass das Produkt auf A^{gr} nur den führenden Teil des Produkts auf A übrigbehält und dieser oft einfacher zu berechnen ist und doch wesentliche Information enthält. Beispiel:

$$A = S_{\text{cl}}^*(\Omega, \mathbb{R}^n)/S^{-\infty}(\Omega, \mathbb{R}^n) \text{ mit dem (komplizierten) Produkt } \#, \text{ dann}$$

$$A^{gr} = \bigoplus_m S_{\text{cl}}^{[m]}(\Omega, \mathbb{R}^n) \text{ mit punktwieser Multiplikation von Funktionen als Produkt.}$$

Insbesondere ist in diesem Beispiel das Produkt auf A nicht-kommutativ, das auf A^{gr} aber kommutativ.

Wir formulieren nun die wesentlichen Eigenschaften, die die Parametrix-Konstruktion, Satz 42, ermöglichen. Wir schreiben $S^{[m]} = S^m/S^{m-1}$. Damit alle Kompositionen definiert sind, formulieren wir dies für eigentlich getragene Operatoren Ψ_{eig}^* .

¹⁷Allgemein ist eine **Graduierung** einer Algebra A eine Folge von Untervektorräumen $A^m, m \in \mathbb{Z}$, mit $A = \bigoplus_m A^m$ als Vektorraum und $A^m \cdot A^{m'} \subset A^{m+m'}$ für alle m, m' , und eine **graduierete Algebra** ist eine Algebra mit Graduierung. Dies nennt man auch eine \mathbb{Z} -Graduierung (häufig trifft man auch \mathbb{Z}_2 -Graduierungen an, wobei $\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$). Graduierte Algebren sind spezieller als filtrierte Algebren: Jede graduierete Algebra ist mittels $A_m := \bigoplus_{m' \leq m} A^{m'}$ filtriert, aber nicht jede filtrierte Algebra ist graduieret (d.h. isomorph zu ihrer graduiereten Algebra). Z.B. ist die Algebra der Polynome graduieret (mit $A^m = \{\text{Polynome, die homogen vom Grad } m \text{ sind}\}$). Aber $\text{Diff}^*(\Omega)$ mit Komposition ist nicht graduieret, da das Produkt zweier homogener Elemente nicht wieder homogen zu sein braucht, z.B. ist mit $P = D, Q = a$ (Multiplikation mit der Funktion a) zwar P homogen vom Grad 1 und Q homogen vom Grad 0, aber $PQ = aD + \frac{1}{i}a$ ist nicht homogen, da es Terme nullter und erster Ordnung enthält.

¹⁸Beweis: $[a'] = [a] \Rightarrow a' = a + r$ mit $r \in A_{m-1}$. $[b'] = [b] \Rightarrow b' = b + s$ mit $s \in A_{l-1}$. Dann $a'b' = ab + rb + as + rs$, und $rb + as + rs \in A_{m+l-1}$, also $[a'b'] = [ab]$.

Satz 47. $\sigma_* : \Psi_{\text{eig}}^* \rightarrow S^{[*]}$ ist ein Homomorphismus filtrierter Algebren.

D.h. σ_* ist linear, bildet $\Psi_{\text{eig}}^m \rightarrow S^{[m]}$ ab und $\sigma_{m+m'}(P \circ Q) = \sigma_m(P)\sigma_{m'}(Q)$.

Satz 48. Die Folge von Abbildungen

$$0 \rightarrow \Psi_{\text{eig}}^{m-1} \xrightarrow{i} \Psi_{\text{eig}}^m \xrightarrow{\sigma_m} S^{[m]} \rightarrow 0$$

ist eine kurze exakte Sequenz für jedes m , d.h. das Bild jeder Abbildung ist gleich dem Kern der folgenden Abbildung (i ist die Inklusion).

Die erste und letzte Abbildung sind die einzig möglichen, trivialen, also die Nullabbildungen: $0 \rightarrow 0$ bzw. $p \rightarrow 0$ für alle p . Im Einzelnen:

- Exakt bei Ψ_{eig}^{m-1} : Wegen $\text{Bild}(0) = 0$ bedeutet dies, dass i injektiv ist. Das ist trivial.
- Exakt bei Ψ_{eig}^m : Dies bedeutet, dass für alle $P \in \Psi_{\text{eig}}^m$ gilt: $P \in \Psi_{\text{eig}}^{m-1} \Leftrightarrow \sigma_m(P) = 0$. Das stimmt, da $\sigma_m(P) = 0 \Leftrightarrow \sigma(P) \in S^{m-1}$ nach Definition des Hauptsymbols.
- Exakt bei $S^{[m]}$: Wegen $\text{Kern}(0) = S^{[m]}$ bedeutet dies, dass σ_m surjektiv ist, d.h. $\forall p \in S^{[m]}$ gibt es $P \in \Psi_{\text{eig}}^m$ mit $p = \sigma_m(P)$. Das folgt aus Lemma 35.

Bemerkung: Die Aussage des Satzes ist äquivalent zur Aussage, dass σ_m einen Isomorphismus $\Psi_{\text{eig}}^m / \Psi_{\text{eig}}^{m-1} \rightarrow S^{[m]}$ definiert. Wegen $S^{[m]} = S^m / S^{m-1}$ ist dies eine 'grobe' Version (Hauptsymbol statt Symbol) der Umkehrabbildung von (35).

Schließlich brauchen wir noch die asymptotische Summation:

Satz 49. Für $P_j \in \Psi_{\text{eig}}^{m-j}$, $j \in \mathbb{N}_0$ existiert ein $P \in \Psi_{\text{eig}}^m$ mit $P \sim \sum_{j=0}^{\infty} P_j$, d.h. $P - \sum_{j=0}^{N-1} P_j \in \Psi_{\text{eig}}^{m-N}$, $\forall N$.

Dies folgt direkt aus Satz 25 über die asymptotische Summation für Symbole.

In Kapitel III.11 lernen wir als erste Anwendung der Parametrixkonstruktion den Satz über die elliptische Regularität kennen.

III.10 Ψ DOs auf Sobolevräumen

Bisher kennen wir folgende Abbildungseigenschaften eines Ψ DO P :

$$P : C_0^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega), \quad P : \mathcal{E}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$$

und Verbesserungen bzgl. der Trägereigenschaften, falls P eigentlich getragen ist.

Zwischen $C_0^\infty(\Omega)$ und $\mathcal{E}'(\Omega)$ liegen viele andere Funktionenräume, z.B. die Sobolevräume. Wie verhalten sich Ψ DOs auf Sobolevräumen?

Zur Erinnerung: Für $s \in \mathbb{R}$ ist

$$H^s(\mathbb{R}^n) := \{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : \langle \xi \rangle^s \hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$$

die Menge der Distributionen auf \mathbb{R}^n , die global die Sobolev-Regularität s haben. Für $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen definieren wir

$$H_{\text{loc}}^s(\Omega) := \{u \in \mathcal{D}'(\Omega) : \rho u \in H^s(\mathbb{R}^n) \forall \rho \in C_0^\infty(\Omega)\}$$

$$H_{\text{comp}}^s(\Omega) := H_{\text{loc}}^s(\Omega) \cap \mathcal{E}'(\Omega)$$

die Menge der Distributionen auf Ω , die lokal die Sobolev-Regularität s haben, und die kompakt getragenen H^s -Distributionen auf Ω . Beachte, was Zugehörigkeit einer Funktion (bzw. Distribution) zu den Funktionenräumen bedeutet:

- $H_{\text{loc}}^s(\Omega)$ und $C^\infty(\Omega)$: Bedingungen an *lokales Verhalten*¹⁹;
- $H_{\text{comp}}^s(\Omega)$ und $C_0^\infty(\Omega)$: zusätzlich *kompakter Träger*;

¹⁹aber keine Bedingung daran, wie sich dies quantitativ zum Rand oder nach 'unendlich' hin verschlechtert

• $H^s(\Omega)$ bzw. $C_b^\infty(\Omega)$: das jeweilige Regularitätsverhalten gilt *gleichmäßig* auf ganz Ω .²⁰
 Offenbar gilt $H_{\text{comp}}^s(\Omega) \subset H^s(\Omega) \subset H_{\text{loc}}^s(\Omega)$ und analog $C_0^\infty(\Omega) \subset C_b^\infty(\Omega) \subset C^\infty(\Omega)$.

Was können wir erwarten? Betrachten wir die zwei Aspekte *Regularität* (d.h. die Sobolevordnung s) und *Trägereigenschaften/Gleichmäßigkeit* getrennt:

Regularität: Wir wissen, dass ein Differentialoperator der Ordnung m die Sobolevordnung (also s) um m reduziert. Dasselbe werden wir für Ψ DOs der Ordnung m zeigen.²¹

Trägereigenschaften/Gleichmäßigkeit: Wir können Ψ DOs nur auf kompakt getragene Distributionen anwenden. Da sie nicht lokal sind, wird das Ergebnis i.A. nicht kompakt getragen sein und nur lokale Regularität haben.

Falls wir zusätzlich Forderungen stellen, lässt sich das verbessern:

- Eigentlich getragene Ψ DOs werden $\text{comp} \rightarrow \text{comp}$ und $\text{loc} \rightarrow \text{loc}$ abbilden, vgl. Proposition 33.
- Falls wir annehmen, dass die Symbolabschätzungen *gleichmäßig auf Ω* gelten (d.h. die Konstanten in (13) hängen nicht von K ab), erwarten wir gute Abbildungseigenschaften zwischen H^s -Räumen (ohne loc und comp).

Daher ist folgender Satz nicht überraschend.

Satz 50. *Sei $P \in \Psi^m(\Omega)$. Dann gilt:*

a) P bildet ab

$$P : H_{\text{comp}}^s(\Omega) \rightarrow H_{\text{loc}}^{s-m}(\Omega).$$

b) Ist P eigentlich getragen, so

$$P : H_{\text{loc}}^s(\Omega) \rightarrow H_{\text{loc}}^s(\Omega), \quad P : H_{\text{comp}}^s(\Omega) \rightarrow H_{\text{comp}}^{s-m}(\Omega).$$

c) Falls $P \in \Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$ (Definition siehe unten), so

$$P : H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-m}(\mathbb{R}^n).$$

Man kann die Räume $H_{\text{comp}}^s(\Omega)$, $H^s(\mathbb{R}^n)$ und $H_{\text{loc}}^s(\Omega)$ mit natürlichen Topologien versehen, dann ist P jeweils stetig.

Wir werden den Satz nicht vollständig beweisen, aber die wesentlichen Schritte skizzieren. Zunächst zur Definition von $\Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$. Die Symbolabschätzungen sollen hier gleichmäßig für alle x gelten.

Definition 51. *Für $m \in \mathbb{R}$ definiere*

$$S_b^m(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^n) := \{p \in C^\infty(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^n) : \forall \alpha, \beta, \exists C_{\alpha, \beta} \text{ mit} \\ |D_x^\alpha D_\xi^\beta p(x, \xi)| \leq C_{\alpha, \beta} \langle \xi \rangle^{m-|\beta|} \quad \forall x \in \mathbb{R}^N, \xi \in \mathbb{R}^n\}$$

$\Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$ sei die Menge der Pseudodifferentialoperatoren auf \mathbb{R}^n , die mittels einer Amplitude in $S_b^m(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ definiert werden können.

Analog zu $\text{Diff}^m(\mathbb{R}^n) \subset \Psi^m(\mathbb{R}^n)$ haben wir $\text{Diff}_b^m(\mathbb{R}^n) \subset \Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$, wobei $\text{Diff}_b^m(\mathbb{R}^n)$ die Differentialoperatoren mit $C_b^\infty(\mathbb{R}^n)$ -Koeffizienten sind.

Für $\Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$ gelten dieselben Sätze wie für $\Psi^m(\mathbb{R}^n)$, mutatis mutandis, und einige Verbesserungen. Z.B. hat jeder Operator ein Symbol in $S_b^m(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, $\Psi_b^*(\mathbb{R}^n)$ ist abgeschlossen unter Adjungieren und sogar unter Komposition (ohne die Einschränkung, eigentlich getragen zu sein). Siehe Abschnitt III.14.

Der Kern des Beweises von Satz 50 liegt in folgender Aussage. Dies ist der Spezialfall $s = m = 0$ von c). Wegen seiner Bedeutung formulieren wir ihn als eigenen Satz.

²⁰Wir haben $H^s(\Omega)$ hier nicht definiert. Für $s \in \mathbb{N}_0$ ist dies die Menge der L^2 -Funktionen, deren Ableitungen bis zur Ordnung s in L^2 sind. Für beliebige $s \in \mathbb{R}$ lässt sich $H^s(\Omega)$ ausgehend von diesem Spezialfall mittels Interpolation und Dualität definieren, aber wir benötigen das hier nicht.

²¹wobei für Ψ DOs m auch negativ sein kann, also die Sobolevordnung verbessert werden kann!

Satz 52. $P \in \Psi_b^0(\mathbb{R}^n)$, dann ist $P : L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ beschränkt.

Genauer bedeutet dies: Es gibt ein $C > 0$, so dass für alle $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ gilt:

$$\|Pu\|_{L^2} \leq C\|u\|_{L^2}.$$

Weil $C_0^\infty(\Omega)$ dicht in $L^2(\Omega)$ ist, gibt es dann eine eindeutige stetige Fortsetzung $P : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$.

Ein Beweis ist z.B. in Shubin zu finden. Hier soll nur kurz erläutert werden, warum diese Aussage sinnvoll ist. Dazu betrachten wir zwei Spezialfälle für einen Ψ DO

$$(Pu)(x) = \int e^{ix\xi} p(x, \xi) \hat{u}(\xi) d\xi$$

mit $p \in S_b^0$:

- p hängt nur von x ab, $p(x, \xi) = b(x)$ für eine beschränkte Funktion b auf \mathbb{R}^n . Dann ist $Pu = bu$ (Multiplikationsoperator mit b) und daher $\|Pu\|_{L^2}^2 = \int |bu|^2 \leq (\sup |b|)^2 \|u\|_{L^2}^2$.
- p hängt nur von ξ ab. Dann ist $\widehat{Pu} = p(\xi)\hat{u}$, also

$$\|Pu\|_{L^2} = \|\widehat{Pu}\|_{L^2} = \|p\hat{u}\|_{L^2} \leq (\sup |p|) \|\hat{u}\|_{L^2} = (\sup |p|) \|u\|_{L^2}$$

nach Parseval. In diesem Fall ist P der Faltungsoperator $Pu = \check{p} * u$.

Im Fall a) wird das 'b' von S_b^0 verwendet, im zweiten Fall die 'p'.²²

Beweis (von Satz 50): Aufbauend auf Satz 52 beweisen wir zunächst Teil c). Sei $\langle D \rangle^s$ der Ψ DO mit Symbol $\langle \xi \rangle^s$. Per Definition ist $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ genau dann, wenn $\langle D \rangle^s u \in L^2(\mathbb{R}^n)$. Genauer: $\langle D \rangle^s : H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ ist ein Isomorphismus. Analog ist $\langle D \rangle^{s-m} : H^{s-m}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ ein Isomorphismus. Wir definieren $P' := \langle D \rangle^{s-m} P \langle D \rangle^{-s}$. Wegen $\langle D \rangle^s \in \Psi_b^s(\mathbb{R}^n)$ ist $P' \in \Psi_b^0(\mathbb{R}^n)$ und somit $P' : L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ beschränkt. Damit ist

$$P = \langle D \rangle^{-s+m} P' \langle D \rangle^s : H^s \xrightarrow{\langle D \rangle^s} L^2 \xrightarrow{P'} L^2 \xrightarrow{\langle D \rangle^{-s+m}} H^{s-m}$$

beschränkt.

Für Teil a) genügt es, zu zeigen, dass für beliebige $\rho, \rho' \in C_0^\infty(\Omega)$ und $P \in \Psi^m(\Omega)$ gilt, dass der Operator $P' := \rho P \rho'$ beschränkt $H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-m}(\mathbb{R}^n)$ ist. Nun ist aber $P' \in \Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$, denn falls P durch die Amplitude a gegeben ist, so ist P' durch die Amplitude $a'(x, y, \xi) = \rho(x)\rho'(y)a(x, y, \xi)$ gegeben, und diese ist in $S_b^m(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ wegen der kompakten Träger. Ähnlich zeigt man b). \square

III.11 Elliptische Regularität

Wir kommen nun zu einer ersten Anwendung der Parametrixkonstruktion.

Satz 53 (Elliptische Regularität, C^∞ -Version). Sei $P \in \Psi^m(\Omega)$ elliptisch, $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$. Dann gilt

$$Pu = f, f \in C^\infty(\Omega) \implies u \in C^\infty(\Omega).$$

Ist P eigentlich getragen (z.B. ein Differentialoperator), gilt dies auch für $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Beispiel:

- $P = \Delta$: harmonische Funktionen sind C^∞ . (wähle $f = 0$)

Beweis: Wir betrachten zunächst den Fall $f = 0$. Sei $Q \in \Psi^{-m}$ eine Parametrix für P , also $QP = I + R$ mit $R \in \Psi^{-\infty}$. Dann gilt:

$$0 = Pu \implies 0 = QPu = (I + R)u = u + Ru \implies u = -Ru.$$

Da R glättend ist, folgt $Ru \in C^\infty$ und schließlich $u \in C^\infty$.

²²wobei in diesem Spezialfall nur die Abschätzung $|p(\xi)| \leq C \langle \xi \rangle^0$, nicht aber die Abschätzungen für die Ableitung benötigt wurden

Sei nun $f \in C^\infty$. Zunächst bemerken wir, dass P sogar eine eigentlich getragene Parametrix hat. Denn ist Q eine beliebige Parametrix mit Schwartz Kern K , so setze $K' = \rho K$, wobei $\rho \in C^\infty(\Omega \times \Omega)$ eigentlich getragen und gleich 1 in einer Umgebung der Diagonale ist. Wegen $\text{sing supp } K \subset \text{Diag}_\Omega$ ist $K' - K$ glatt, d.h. für den Operator Q' mit Schwartz Kern K' gilt $Q' - Q \in \Psi^{-\infty}$. Daraus folgt sofort, dass Q' auch eine Parametrix für P ist, und Q' ist kompakt getragen.

Sei also Q eine eigentlich getragene Parametrix für P . Dann haben wir

$$f = Pu \implies Qf = QPu = (I + R)u = u + Ru \implies u = Qf - Ru.$$

Da $Qf \in C^\infty$ und $Ru \in C^\infty$, folgt wieder $u \in C^\infty$.

Ist P eigentlich getragen, so ist es auch R und die Gleichung $Pu = f$ sowie Ru sind für $u \in \mathcal{D}'$ definiert. Dasselbe Argument wie vorher liefert $f \in C^\infty$. \square

Mittels der Sobolev-Räume lässt sich dies verfeinern:

Satz 54 (Elliptische Regularität, Sobolev-Version). *Sei $P \in \Psi^m(\Omega)$ elliptisch, $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$. Dann gilt*

$$Pu = f, f \in H_{\text{loc}}^s(\Omega) \implies u \in H_{\text{loc}}^{s+m}(\Omega).$$

Ist P eigentlich getragen, gilt dies auch für $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Beispiel:

- $P = \Delta$, also $m = 2$. Aus $\Delta u = f$ und $f \in H_{\text{loc}}^s$ folgt $u \in H_{\text{loc}}^{s+2}$.

Dies ist die natürliche Umkehrung der offensichtlichen Aussage $u \in H_{\text{loc}}^{s+2} \implies f \in H_{\text{loc}}^s$ und damit die bestmögliche Regularität, die man für u erhoffen kann.

Zum Vergleich: Aus $u \in C^{k+2}$ folgt $f \in C^k$, aber aus $f \in C^k$ folgt nicht $u \in C^{k+2}$.

Beweis: Der Beweis ist im Wesentlichen identisch mit dem Beweis von Satz 53. Der Hauptpunkt ist $f \in H_{\text{loc}}^s \implies Qf \in H_{\text{loc}}^{s+m}$. Zusätzlich ist $Ru \in C^\infty \subset H_{\text{loc}}^{s+m}$. \square

Satz 53 lässt sich aus Satz 54 herleiten: Ist $f \in C^\infty$, so ist $f \in H_{\text{loc}}^s$ für alle s , also $u \in H_{\text{loc}}^{s+m}$ für alle s , also $u \in C^\infty$ nach dem Einbettungssatz.

III.12 Transformation von Ψ DOs unter Koordinatentransformation

Seien $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\Omega' \subset \mathbb{R}^n$ und $\kappa : \Omega \rightarrow \Omega'$ ein Diffeomorphismus, dann ist durch κ ein Koordinatenwechsel gegeben.

Beispiel:

- $\Omega = \Omega' = \mathbb{R}^2$, $x' = \kappa(x)$ mit $x'_1 = x_1 + x_2$ und $x'_2 = x_1 - x_2$. Dies ist ein linearer Koordinatenwechsel.

Jedem Objekt (z.B. Funktion, Operator) auf Ω' entspricht ein Objekt auf Ω . Für Funktionen ist diese Entsprechung durch Zurückziehen $\kappa^* : C^\infty(\Omega') \rightarrow C^\infty(\Omega)$, $u \mapsto u \circ \kappa$ gegeben. Die Gleichung $u = \kappa^* u'$ kann man auch

$$u(x) = u'(x'), \quad \text{falls } x' = \kappa(x)$$

schreiben. Für Operatoren (z.B. Ψ DOs) liest man die Entsprechung an dem Diagramm

$$\begin{array}{ccc} C_0^\infty(\Omega') & \xrightarrow{P'} & C^\infty(\Omega') \\ \downarrow \kappa^* & & \downarrow \kappa^* \\ C_0^\infty(\Omega) & \xrightarrow{P} & C^\infty(\Omega) \end{array}$$

ab: $P = \kappa^* \circ P' \circ (\kappa^*)^{-1}$. Dies ließe sich auch schreiben als

$$(Pu)(x) = (P'u')(x'), \quad \text{falls } x' = \kappa(x), \quad u = \kappa^* u'.$$

Wir schreiben auch $P = (P')_\kappa$, der unter κ zurückgezogene Operator P' .

Satz 55. Sei $\kappa : \Omega \rightarrow \Omega'$ ein Diffeomorphismus und $P' \in \Psi^m(\Omega')$. Sei $P := (P')_\kappa$ der transformierte Operator. Dann ist $P \in \Psi^m(\Omega)$, und es gilt

$$\sigma_m(P)(x, \xi) = \sigma_m(P')(x', \xi'), \text{ mit } x' = \kappa(x), \xi' = (D\kappa|_x)^{-1}\xi \quad (46)$$

Hierbei bezeichnet $D\kappa$ die Jacobimatrix von κ und $D\kappa^t$ ihr Transponiertes. Bemerkenswert ist hier vor allem, wie die ξ -Variable transformiert wird. Es gibt auch eine Formel für das vollständige Symbol, doch ist diese sehr viel komplizierter.

Beweis: Wir schreiben den Operator P' explizit aus und wechseln die Variablen. Sei P' durch die Amplitude a' gegeben. Mit $x' = \kappa(x)$ und $u = \kappa^* u'$, also $u'(y') = u(y)$ für $y' = \kappa(y)$ gilt:

$$\begin{aligned} (Pu)(x) &= (P'u')(x') = \int \int e^{i(x'-y')\xi'} a'(x', y', \xi') u'(y') dy' d\xi' = \\ &= \int \int e^{i(\kappa(x) - \kappa(y))\xi'} a'(\kappa(x), \kappa(y), \xi') |\det D\kappa|_y| u(y) dy d\xi'. \end{aligned} \quad (47)$$

Wir müssen dies so umschreiben, dass der Exponentialterm in(47) von der Form $e^{i(x-y)\xi}$ ist. Dies geht wie folgt:

- Falls $\kappa(x) = Tx$ linear ist, dann ist $(\kappa(x) - \kappa(y))\xi' = (Tx - Ty)\xi' = [T(x - y)]\xi' = (x - y)(T^t\xi') = (x - y)\xi$ mit $\xi = T^t\xi'$, wobei T^t das Transponierte von T ist.
- Falls κ beliebig ist, verwenden wir die Taylorentwicklung erster Ordnung: $\kappa(x) = \kappa(y) + G(x, y)(x - y)$, wobei $G(x, y)$ eine $n \times n$ -Matrix für alle x, y ist und glatt von x, y abhängt. Dabei ist

$$G(x, y) = D\kappa|_y \quad (48)$$

Also $\kappa(x) - \kappa(y) = G(x, y)(x - y)$ und $(\kappa(x) - \kappa(y))\xi' = (x - y)(G^t(x, y)\xi') = (x - y)\xi$ mit $\xi = G^t(x, y)\xi'$. Für das Volumenelement folgt $d\xi' = \frac{1}{|\det G^t(x, y)|} d\xi$.

Aus (47) wird nun:

$$\begin{aligned} (Pu)(x) &= \int \int e^{i(x-y)\xi} a'(\kappa(x), \kappa(y), G^t(x, y)^{-1}\xi) \frac{|\det D\kappa|_y|}{|\det G^t(x, y)|} u(y) dy d\xi \\ &= \int \int e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi) u(y) dy d\xi \quad \text{mit} \\ a(x, y, \xi) &= a'(\kappa(x), \kappa(y), G^t(x, y)^{-1}\xi) \frac{|\det D\kappa|_y|}{|\det G^t(x, y)|} \end{aligned} \quad (49)$$

Wir haben hier angenommen, dass $G(x, y)$ für alle x, y invertierbar ist. Dies ist nicht notwendig der Fall. Wir wissen aber, dass $G(y, y) = D\kappa|_y$ für alle $y \in \Omega$ invertierbar ist, da κ ein Diffeomorphismus ist. Nun ist die Menge der invertierbaren Matrizen offen in der Menge aller Matrizen (als Urbild der Null unter der Abbildung \det). Da G stetig ist, folgt, dass die Menge $U = \{(x, y) : G(x, y) \text{ ist invertierbar}\} \subset \Omega \times \Omega$ offen ist. Da diese Menge Diag_Ω enthält, gibt es nach Lemma 28 eine glatte Funktion ρ mit Träger in U , die gleich eins in einer Umgebung von Diag_Ω ist. Die Rechnung oben ist nun gerechtfertigt, wenn wir a durch ρa (bzw. a' durch $\rho' a'$) ersetzen. Der Fehler $(1 - \rho)a$ trägt nur einen glättenden Operator bei, für den die Behauptung des Satzes offensichtlich ist. Daher können wir im Folgenden o.B.d.A. annehmen, dass schon $\text{supp } a \subset U \times \mathbb{R}^n$, also $G(x, y)$ auf dem Integrationsgebiet integrierbar ist.

Es ist nachzuprüfen, dass a ein Symbol ist. Dies kann man relativ leicht nachrechnen und wird dem Leser überlassen. Also folgt $P \in \Psi^m(\Omega)$.

Es ist noch die Relation (46) der Hauptsymbole nachzuprüfen. Allgemein folgt aus der Formel für das Symbol $\sigma(P)(x', \xi') = a'(x', x', \xi') + \sum_{|\alpha| \geq 1} \frac{1}{\alpha!} \partial_y^\alpha D_\xi^\alpha a'|_{y'=x'}$, dass in $S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)/S^{m-1}(\Omega, \mathbb{R}^n)$

$$\sigma_m(P')(x', \xi') = [a'(x', x', \xi')].$$

Aus (49) und (48) erhält man also

$$\sigma_m(P)(x, \xi) = [a(x, x, \xi)] = [a'(\kappa(x), \kappa(x), G^t(x, x)^{-1}\xi) \underbrace{\frac{|\det D\kappa|_x|}{|\det G^t(x, x)|}}_{=1}] = \sigma_m(P')(x', \xi')$$

mit $\xi' = ((D\kappa)|_x)^{-1}\xi$, was zu zeigen war. \square

III.13 Ψ DOs auf Mannigfaltigkeiten

Grundzüge der Analysis auf Mannigfaltigkeiten

Sei M eine Mannigfaltigkeit der Dimension n , d.h. $\forall p \in M \exists$ eine offene Umgebung U von p in M und eine lokale Karte $\varphi : \tilde{U} \rightarrow U$ mit $\tilde{U} \subset \mathbb{R}^n$.²³ Mit Hilfe der lokalen Karten können wir Begriffe der Analysis von \mathbb{R}^n auf M übertragen. Dies wird im Folgenden skizziert.

Definition 56. Eine Funktion $f : M \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **glatt**, wenn $f \circ \varphi : \tilde{U} \rightarrow \mathbb{C}$ glatt ist für alle Karten φ . Damit sind $C^\infty(M)$ und $C_0^\infty(M)$ definiert. f heißt **lokal integrierbar** ($f \in L_{\text{loc}}^1(M)$), wenn $f \circ \varphi$ für alle φ lokal integrierbar ist. Die Topologien auf $C^\infty(M)$ und $C_0^\infty(M)$ sind analog wie im Fall von $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ definiert.

Die Abbildung $\varphi^{-1} : U \rightarrow \tilde{U}$ nennt man auch **lokale Koordinaten**, denn schreiben wir $\varphi^{-1}(p) = x = (x_1, \dots, x_n)$, so können wir x_1, \dots, x_n als Koordinaten des Punktes $p \in U \subset M$ auffassen. Die Funktion $\tilde{f} = f \circ \varphi$ ist dann f **in lokalen Koordinaten**, da $f(p) = \tilde{f}(x)$. Eine Funktion ist also per Definition glatt, wenn sie in beliebigen lokalen Koordinaten glatt ist.

Wie im Fall von $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ möchten wir Distributionen auf M wieder als stetige lineare Funktionale auf $C_0^\infty(M)$ definieren und dabei $L_{\text{loc}}^1(M)$ als Teilmenge von $\mathcal{D}'(M)$ auffassen. Für Distributionen auf $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ taten wir das mittels der Formel $\langle T_f, \psi \rangle := \int_{\Omega} f(x)\psi(x)dx$ für Testfunktionen ψ . Im

Fall von Mannigfaltigkeiten stellt sich die Frage, was anstelle des Lebesgue-Maßes dx verwendet werden soll. Die einfachste Art, damit umzugehen, ist, als Ersatz für dx eine feste **positive Dichte** $d\mu$ auf M zu wählen. Das heißt:

- $d\mu$ ist ein Maß auf M (bzgl. der σ -Algebra der Borelmengen).
- $d\mu$ ist "glatt" in folgenden Sinn: für alle Karten $\varphi : \tilde{U} \rightarrow U \subset M$ ist das Maß $(\varphi^{-1})_* d\mu|_U$ auf \tilde{U} von der Form $(\varphi^{-1})_* d\mu|_U = c(x)dx$ mit $c \in C^\infty(\tilde{U})$ und $c > 0$ (das schließt beispielsweise das Dirac-Maß aus).

Definition 57. Sei $d\mu$ eine fest gewählte positive Dichte auf M . Eine **Distribution auf M** ist ein stetiges lineares Funktional auf $C_0^\infty(M)$. Wir identifizieren $f \in L_{\text{loc}}^1(M)$ mit einer Distribution T_f mittels $\langle T_f, \psi \rangle := \int_M f\psi d\mu$ für $\psi \in C_0^\infty(M)$.²⁴

Damit ist $\mathcal{D}'(M)$ und $\mathcal{E}'(M)$ definiert (aber nicht $\mathcal{S}'(M)$).

Definition 58. Ein **Differentialoperator auf M** ist ein linearer Operator $P : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$, der bzgl. jeder lokalen Karte $\varphi : \tilde{U} \rightarrow U$ ein Differentialoperator auf \tilde{U} ist, genauer: P ist lokal und für alle $u \in C_0^\infty(U)$ ist $Pu = (\varphi^*)^{-1}P_\varphi\varphi^*u$, wobei P_φ ein Differentialoperator auf \tilde{U} ist.

Sind $\varphi : \tilde{U} \rightarrow U$ und $\varphi' : \tilde{U}' \rightarrow U'$ lokale Karten mit $U \cap U' \neq \emptyset$, so heißt die Abbildung $\kappa = (\varphi')^{-1} \circ \varphi$ **Koordinatenwechsel**.²⁵

Bedeutung von κ : Ist $p \in U \cap U'$ und sind x, x' die Koordinaten von p bzgl. der Koordinaten φ^{-1} , $(\varphi')^{-1}$, so ist $\kappa(x) = x'$.

Dann ist P_φ der bzgl. κ umgeschriebene Operator $P_{\varphi'}$, also

$$P_\varphi = (P_{\varphi'})_\kappa \tag{50}$$

²³Dies ist eine Kurzfassung, es müssen zusätzlich ein paar weitere Bedingungen erfüllt sein: M ist topologischer Raum mit der Hausdorff- und der zweiten Abzählbarkeitseigenschaft, die φ sind Homöomorphismen und die Koordinatenwechsel sind glatt. Für Untermannigfaltigkeiten $M \subset \mathbb{R}^N$ sind diese Bedingungen automatisch erfüllt, wenn man fordert, dass φ eine Immersion und ein Homöomorphismus auf sein Bild ist.

²⁴Alternativ kann man $\mathcal{D}'(M)$ als Dualraum von $C_0^\infty(M, \Omega) := \{\text{glatte Dichten auf } M \text{ mit kompaktem Träger}\}$ definieren. Eine glatte Dichte ist dabei ein signiertes Maß, das glatt im obigen Sinne ist. Dabei muss c nicht positiv sein. Ist $\psi \in C_0^\infty(M, \Omega)$ und $f \in L_{\text{loc}}^1(M)$, so ist $\int_M f\psi$ definiert. Diese Definition ist auf lange Sicht besser, da sie natürlich – unabhängig von der Wahl eines $d\mu$ – ist.

²⁵Es ist $\kappa : \tilde{V} \rightarrow \tilde{V}'$, wobei $\tilde{V} = \varphi^{-1}(U \cap U') \subset \tilde{U}$ und $\tilde{V}' = (\varphi')^{-1}(U \cap U') \subset \tilde{U}'$ ist.

Definition 59. Sobolevräume auf einer Mannigfaltigkeit M :

$$H_{\text{loc}}^s(M) := \{u \in \mathcal{D}'(M) : \text{für jede lokale Karte } \varphi \in \tilde{U} \rightarrow U \text{ ist } \varphi^*(u|_U) \in H_{\text{loc}}^s(\tilde{U})\},$$

$$H_{\text{comp}}^s(M) := H_{\text{loc}}^s(M) \cap \mathcal{E}'(M).$$

Ist M kompakt, so schreiben wir $H^s(M) := H_{\text{loc}}^s(M)$.

Die wichtigsten Sätze über Sobolev-Räume gelten auch auf Mannigfaltigkeiten, in der folgenden Form:

- Restriktionssatz: Sei $N \subset M$ Untermannigfaltigkeit, wobei N Dimension $n - 1$ und M Dimension n hat. Für $u \in H_{\text{loc}}^s(M)$ und $s > \frac{1}{2}$ ist die Einschränkung $u|_N$ definiert und liegt in $H_{\text{loc}}^{s-\frac{1}{2}}(N)$.
- Einbettungssatz: $H_{\text{loc}}^s(M) \subset C^k(M)$, falls $s > \frac{n}{2} + k$.
- Kompaktheitssatz: Falls M kompakt ist, so ist die Einbettung $H^s(M) \rightarrow H^t(M)$ ein kompakter Operator, falls $s > t$.

Bemerkung: Ist M kompakt, dann ist $H^s(M)$ ein Hilbertraum. Das Skalarprodukt ist wie folgt definiert:²⁶ Sei $M = \bigcup_i U_i$ eine endliche Überdeckung mit lokalen Kartengebieten. Sei (ρ_i) eine Partition der Eins zur Überdeckung U_i . Dann definiere das Skalarprodukt von $u, v \in H^s(M)$ durch

$$\langle u, v \rangle_{H^s(M)} := \sum_i \langle \varphi_i^*(\rho_i u), \varphi_i^*(\rho_i v) \rangle_{H^s(\mathbb{R}^n)}$$

Verschiedene Wahlen der U_i , φ_i und ρ_i ergeben verschiedene Skalarprodukte, doch sind diese äquivalent zueinander.

Im Fall $s = 0$ lässt sich ein (äquivalentes) Skalarprodukt auf $H^0(M) = L^2(M)$ auch durch $\langle u, v \rangle = \int_M u \bar{v} d\mu$ definieren, für eine positive Dichte $d\mu$.

Der Schwartzsche Kernsatz gilt auch auf Mannigfaltigkeiten. Sei $d\mu$ eine fest gewählte positive Dichte auf M . Dann definiert jedes $K \in \mathcal{D}'(M \times M)$ einen stetigen linearen Operator $P_K : C_0^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ mittels der Formel

$$(P_K u)(x) = \int_M K(x, y) u(y) d\mu(y)$$

und für jeden stetigen linearen Operator $P : C_0^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ gibt es genau ein $K \in \mathcal{D}'(M \times M)$ mit $P = P_K$.²⁷

Definition 60. Ein Ψ DO der Ordnung m auf M ist ein stetiger linearer Operator $C_0^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$, dessen Schwartzkern K folgende Eigenschaften hat:

- $\text{sing supp } K \subset \text{Diag}_M := \{(x, y) \in M \times M : x = y\}$.
- Für jede lokale Karte $\varphi : \tilde{U} \rightarrow U$ ist $K_\varphi(\tilde{x}, \tilde{y}) := K(\varphi(\tilde{x}), \varphi(\tilde{y}))$ der Schwartzkern eines Ψ DO P_φ auf \tilde{U} , d.h. $\exists a \in S^m(\tilde{U} \times \tilde{U}, \mathbb{R}^n) : K_\varphi(\tilde{x}, \tilde{y}) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(\tilde{x}-\tilde{y})\xi} a(\tilde{x}, \tilde{y}, \xi) d\xi$.

Bemerkungen:

- Das Hauptsymbol eines Ψ DO auf M kann als Funktion auf T^*M (Kotangentenbündel) **invariant** verstanden werden, d.h. $\sigma_m(P)(x, \xi)$ ist mit $x \in M$, $\xi \in T_x^*M$ zu interpretieren²⁸. Denn (50) gilt auch hier, und die Transformationsformel für das Hauptsymbol (46) lautet

$$\sigma_m(P_\varphi)(\tilde{x}, \tilde{\xi}) = \sigma_m(P_{\varphi'})(\kappa(\tilde{x}), (D\kappa|_{\tilde{x}})^{-1}\tilde{\xi}).$$

²⁶Erinnerung: Das Skalarprodukt auf $H^s(\mathbb{R}^n)$ ist durch

$$\langle u, v \rangle_{H^s(\mathbb{R}^n)} = \int \hat{u}(\xi) \overline{\hat{v}(\xi)} \langle \xi \rangle^{2s} d\xi$$

definiert.

²⁷Wiederum lässt sich dies natürlicher mit Dichten formulieren...

²⁸ $T_x M$ ist der Tangentialraum an M im Punkt $x \in M$, ein n -dimensionaler Vektorraum. $T_x^* M$ ist sein Dualraum und $T^*M = \bigcup_{x \in M} T_x^* M$ (disjunkte Vereinigung).

Das ist dieselbe Formel, nach der sich Kotangentenvektoren transformieren. D.h. ist $\tilde{\xi}$ die Koordinatendarstellung von $\xi \in T_x M$ bzgl. der Karte φ , so ist $(D\kappa_{|x}^t)^{-1}\tilde{\xi}$ die Koordinatendarstellung von ξ bzgl. der Karte φ' .

- Das (vollständige) Symbol eines Ψ DO auf M lässt sich jedoch nicht in natürlicher Weise invariant auf M definieren.

Die wichtigsten Sätze über Ψ DOs auf kompakten Mannigfaltigkeiten

Mannigfaltigkeiten erscheinen zunächst komplizierter als offene Teilmengen $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Sie haben aber einen Vorteil: Es gibt kompakte Mannigfaltigkeiten ohne Rand, und viele davon haben in verschiedenen Gebieten der Mathematik Bedeutung. Die einfachste ist die Sphäre S^n .

Sei M kompakt. Dann ist $C_0^\infty(M) = C^\infty(M)$, d.h. jeder Operator ist eigentlich getragen. Also ist die Komposition zweier Ψ DOs immer definiert.

- Sei $P \in \Psi^m(M)$ und $Q \in \Psi^l(M)$, dann ist $PQ \in \Psi^{m+l}(M)$ und $\sigma_{m+l}(PQ) = \sigma_m(P)\sigma_l(Q)$.
- Man hat die kurze exakte Sequenz $0 \rightarrow \Psi^{m-1}(M) \rightarrow \Psi^m(M) \xrightarrow{\sigma_m} S^{[m]}(T^*M) \rightarrow 0$.
- Asymptotische Summation: Für $P_j \in \Psi^{m-j}(M)$, $j = 0, 1, 2, \dots$ existiert ein $P \in \Psi^m(M)$ mit $P \sim \sum_{j=0}^\infty P_j$.
- Parametrix: Für $P \in \Psi^m(M)$ elliptisch (d.h. $\sigma_m(P)$ invertierbar) existiert ein $Q \in \Psi^{-m}(M)$ mit:

$$\begin{aligned} PQ &= I \text{ mod } \Psi^{-\infty}(M), \\ QP &= I \text{ mod } \Psi^{-\infty}(M). \end{aligned}$$

- Beschränktheit: Für $P \in \Psi^m(M)$ gilt: $P : H^s(M) \rightarrow H^{s-m}(M)$ ist beschränkt.
- Kompaktheit: Für $P \in \Psi^m(M)$ und $m < 0$ gilt: P ist ein kompakter Operator $H^s(M) \rightarrow H^s(M)$ für alle s .

Beweis: $L^2(M) = H^0(M)$, daher ist $L^2 \xrightarrow{P} H^{-m}$ ein stetiger Operator und $H^{-m} \hookrightarrow L^2$ ein kompakter Operator nach Kompaktheitssatz, da $-m > 0$. Also ist $L^2 \xrightarrow{P} H^{-m} \hookrightarrow L^2$ kompakt. \square

Für $m = -\infty$ lässt sich das auch so einsehen: $P \in \Psi^{-\infty}(M)$ hat Kern $K \in C^\infty(M \times M)$. Da M kompakt ist, folgt $K \in L^2(M \times M)$, also ist P ein Hilbert-Schmidt Operator und damit kompakt.

Man kann zeigen, dass $P \in \Psi^m(M)$ schon für $m < -\frac{n}{2}$ ein Hilbert-Schmidt-Operator ist.

Aus diesen Sätzen und etwas Funktionalanalysis erhält man folgenden fundamentalen Satz.

Satz 61. Sei M kompakt und $P \in \Psi^m(M)$ elliptisch. Dann ist P ein **Fredholm-Operator** $H^m(M) \rightarrow L^2(M)$, d.h.:

- $\dim \text{Ker } P < \infty$,
- $\text{Ran } P$ ist abgeschlossen,
- $\dim \text{coker } P < \infty$, $\text{coker } P := L^2(M)/\text{Ran } P$.

Mit anderen Worten bedeutet dies für die Gleichung $Pu = f$:

- $Pu = 0$ hat nur endlich viele linear unabhängige Lösungen.
- $Pu = f$ ist genau dann lösbar, wenn f endlich viele unabhängige Bedingungen erfüllt.
D.h.: Es gibt ein $N \in \mathbb{N}_0$, $h_1, \dots, h_N \in L^2(M)$, so dass $Pu = f$ genau dann eine Lösung u hat, wenn $f \perp h_i \forall i = 1, \dots, N$.

Hat $Pu = 0$ nur die Nulllösung und ist $N = 0$, so ist P bijektiv, d.h. $Pu = f$ ist für jedes f eindeutig lösbar. Fredholm zu sein bedeutet also, nur ‚endlich-dimensional weit entfernt‘ von Invertierbarkeit zu sein.

Beweis: In der Funktionalanalysis beweist man, dass $P : H^m(M) \rightarrow L^2(M)$ genau dann ein Fredholmoperator ist, wenn ein beschränkter Operator $Q : L^2(M) \rightarrow H^m(M)$ existiert, für den $PQ - I$ und $QP - I$ kompakte Operatoren sind. Wir wählen nun eine Parametrix $Q \in \Psi^{-m}(M)$ für P , dann erfüllt diese die Bedingungen nach den Sätzen oben, denn $PQ - I$ und $QP - I$ sind in $\Psi^{-\infty}(M)$ und damit kompakt. \square

Beispiele von Differentialoperatoren und Ψ DOs auf Mannigfaltigkeiten

- Sei (M, g) eine Riemannsche Mannigfaltigkeit, d.h. für jedes $x \in M$ ist ein Skalarprodukt g_x auf dem Tangentialraum $T_x M$ gegeben. Der **Laplace-Beltrami-Operator** Δ_g ist ein elliptischer Operator zweiter Ordnung. In einer beliebigen lokalen Karte ist er gegeben durch

$$\Delta_g = \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{\sqrt{\det g}} \partial_{x_i} g^{ij} \sqrt{\det g} \partial_{x_j},$$

wobei (g_{ij}) die Darstellung von g in Koordinaten, $\det g$ deren Determinante und (g^{ij}) deren inverse Matrix ist. Für $M = \mathbb{R}^n$ und g die euklidische Metrik ist $\Delta_g = \Delta$ ($\Delta = \operatorname{div} \operatorname{grad}$). Im Allgemeinen sind die g_{ij} nicht-konstante Funktionen von x und daher ist Δ_g ein Operator mit variablen Koeffizienten.

- Der Laplace-Beltrami-Operator operiert auf Funktionen auf M . Er besitzt eine natürliche Verallgemeinerung, den **Hodge-Laplace-Operator** Δ_k . Dieser operiert auf k -Differentialformen, $k \in \{0, 1, \dots, \dim M\}$.²⁹

Wenn M kompakt ist, dann ist $\dim \operatorname{Ker} \Delta_k = \beta_k$ die k -te **Betti-Zahl** von M . Die Betti-Zahl gibt die "Anzahl der k -dimensionalen Löcher von M " an, genauer ist $\beta_k = \dim H^k(M)$, wobei $\dim H^k$ die k -te Kohomologiegruppe von M bezeichnet.

Daher hat der Raum der Lösungen von $\Delta_k u = 0$ topologische Bedeutung. Dieser Zusammenhang von Analysis und Topologie ist ein spannendes Thema, dessen Höhepunkt die Index-Theorie bildet. Ψ DOs sind dabei ein nützliches Werkzeug.

- Ein weiterer wichtiger Operator ist der **Dirichlet-Neumann-Operator**. Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ beschränkt und mit glattem Rand $\partial\Omega$. Wir definieren $N : C^\infty(\partial\Omega) \rightarrow C^\infty(\partial\Omega)$ wie folgt:

Sei $g \in C^\infty(\partial\Omega)$:

Bestimme $u \in C^\infty(\bar{\Omega})$, so dass
$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases},$$

dann definiere $Ng = \frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega}$ (Normalenableitung).

Dies ist wohldefiniert, da das Dirichlet-Problem im zweiten Schritt eine eindeutige Lösung u hat.

Satz 62. $N \in \Psi^1(\partial\Omega)$ und $\sigma_1(N)(x, \xi) = |\xi|$.

Der Beweis erfordert etwas Arbeit. Warum dies stimmen könnte, kann man jedoch schon an folgendem Beispiel sehen: Sei $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, \dots, x_n), x_n \geq 0\}$ (oberer Halbraum). Da Ω unbeschränkt ist, müssen wir die Definition von N für die Eindeutigkeit von u wie folgt modifizieren: Zu $g \in C_0^\infty(\partial\Omega)$ sei u die eindeutige Lösung von $\Delta u = 0$ in Ω , $u|_{\partial\Omega} = g$ mit $u(x_1, \dots, x_n) \rightarrow 0$ für $x_n \rightarrow \infty$. Setze $Ng = \frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega}$.

²⁹0-Differentialformen sind Funktionen, eine 1-Differentialform ist eine Linearform auf $T_x M$ für jedes x , z.B. df für eine Funktion f , eine 2-Differentialform ist eine antisymmetrische Bilinearform auf $T_x M$ für jedes x etc.

Mittels Fourier-Transformation in $x' = (x_1, \dots, x_{n-1})$ erhält man nacheinander

$$\begin{aligned}(\partial_{x_n}^2 - |\xi'|^2)\hat{u}(\xi', x_n) &= 0, \quad \hat{u}(\xi', 0) = \hat{g}(\xi') \\ \hat{u}(\xi', x_n) &= e^{-|\xi'|x_n} \hat{g}(\xi') \\ u(x', x_n) &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{ix'\xi'} e^{-|\xi'|x_n} \hat{g}(\xi') \, d\xi' \\ (Ng)(x') &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{ix'\xi'} |\xi'| \hat{g}(\xi') \, d\xi'\end{aligned}$$

da die nach außen zeigende Normalenableitung $-\partial_{x_n}$ und $x_n = 0$ am Rand ist. Also ist N der Ψ DO auf \mathbb{R}^{n-1} mit Symbol $|\xi'|$.

III.14 Überblick über den Pseudodifferentialkalkül

Da man zwischen den technischen Einzelheiten manchmal den Überblick verliert, soll hier ein kurzer Überblick gegeben werden.

Das Wichtigste in Kürze

Wir betrachten Operatoren, die auf Funktionen oder Distributionen auf einem Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ oder auf einer Mannigfaltigkeit operieren.

- Per Definition ist ein Ψ DO ein Operator, dessen Schwartz Kern außerhalb der Diagonalen $\text{Diag}_\Omega \subset \Omega \times \Omega$ glatt ist und auf der Diagonalen eine konormale Singularität hat.
- Das Symbol des Ψ DOs gibt eine vollständige Beschreibung der Singularität des Schwartz Kerns bei der Diagonale.

Die Beziehung von Kern zu Symbol ist über die Fourier-Transformation gegeben³⁰:

$$K(x, y) \equiv \int e^{i(x-y)\xi} p(x, \xi) \, d\xi = \check{p}(x, x-y) \quad \text{mod } C^\infty$$

- Das Hauptsymbol enthält die Information des Symbols zu führender Ordnung. Im Fall von Mannigfaltigkeiten kann das Hauptsymbol invariant als Funktion auf dem Kotangentenbündel definiert werden. Dies folgt aus der Transformationsformel für Hauptsymbole unter Koordinatenwechsel.
- Komposition und Adjungierte von Ψ DOs sind Ψ DOs. Für die Symbole gibt es asymptotische Formeln. Für die Hauptsymbole gelten die einfachen Formeln (für $P \in \Psi^m(\Omega)$, $Q \in \Psi^l(\Omega)$)

$$\sigma_{m+l}(P \circ Q) = \sigma_m(P)\sigma_l(Q), \quad \sigma_m(P^*) = \overline{\sigma_m(P)}$$

- Mittels der Kompositionsformel für das Hauptsymbol, der kurzen exakten Sequenz für die Symbolabbildung und der asymptotischen Summation lässt sich für elliptische Ψ DOs eine Parametrix, also Inverse modulo $\Psi^{-\infty}(\Omega)$, konstruieren.
- Ψ DOs haben natürliche Abbildungseigenschaften auf Sobolev-Räumen.
- Der Ψ DO-Kalkül ist *konstruktiv* in dem Sinn, dass er Probleme über PDG mittels Konstruktion approximativer Lösungen (Parametrices) löst.

Operatoren – Symbole – Kerne

Der Pseudodifferentialkalkül erhält seine Stärke aus der doppelten Charakterisierung von Operatoren durch Symbole und durch Schwartz Kerne. Während z.B. die Komposition von Operatoren auf der Ebene der (Haupt-)Symbole sehr einfach ist (Multiplikation), auf der Ebene der Kerne aber kompliziert (siehe (14)), sind wichtige Eigenschaften (z.B. Pseudolokalität) nur am Kern ablesbar.

In Tabelle 1 sind einige Beispiele zusammengestellt. Die Menge der Distributionen, die als Kerne von Ψ DOs auftreten, nennt man den Raum der Distributionen auf $\Omega \times \Omega$, die **bzgl.** Diag_Ω **konormal der Ordnung** m sind. Bezeichnung für diesen Raum: $I^m(\Omega \times \Omega, \text{Diag}_\Omega)$.

An der mit (*) bezeichneten Stelle steht dann $I^m(\Omega \times \Omega, \text{Diag}_\Omega)/C^\infty(\Omega \times \Omega)$.

³⁰Dies ist die Definition des Begriffs konormale Singularität in diesem Kontext

	Operator	Symbol	Schwartz Kern
Beispiele	Id	1	$\delta(x - y)$
	$P(x, D) = \sum a_\alpha(x) D^\alpha$	$P(x, \xi)$	$P(x, D_x) \delta(x - y)$
Lösung von $P(D)u = f$		$\frac{1}{P(\xi)}$	$E(x - y)$
Räume	$\Psi^m(\Omega)$	$S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)$	$\mathcal{D}'(\Omega \times \Omega)$
Restterme	$\Psi^{-\infty}(\Omega)$	$S^{-\infty}(\Omega, \mathbb{R}^n)$	$C^\infty(\Omega \times \Omega)$
Bijektive Beziehung	$\Psi^m(\Omega)/\Psi^{-\infty}(\Omega)$	$S^m(\Omega, \mathbb{R}^n)/S^{-\infty}(\Omega, \mathbb{R}^n)$	(*)

Tabelle 1: Übersicht über Operatoren, Symbole, Kerne. In Zeile 3 wird $P(\xi) \neq 0 \forall \xi$ angenommen, und E ist eine Fundamentallösung für $P(D)$

Einige Details zur technischen Durchführung

- Für den Beweis der wichtigsten Sätze (z.B. Adjungierten- und Kompositionsformel) ist es nützlich, Ψ DOs auf $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ mittels Amplituden zu definieren, d.h. der Schwartz Kern ist

$$K_a(x, y) = \int e^{i(x-y)\xi} a(x, y, \xi) d\xi$$

- Dieses Integral konvergiert i.A. nicht. Es ist aber im Sinne der Distributionen wohldefiniert (siehe Fußnote 6). Für den Beweis verwendet man partielle Integration (bzgl. y).
- Verschiedene Amplituden können denselben Ψ DO definieren. Das Symbol eines Ψ DOs ist eine Amplitude, die nur von x und ξ abhängt und den Operator bis auf glättende Fehler definiert. Umgekehrt ist das Symbol durch den Operator eindeutig modulo $S^{-\infty}$ definiert. Man erhält das Symbol mittels der Taylorentwicklung von $y \mapsto a(x, y, \xi)$ um den Punkt $y = x$ und der Formel

$$K_{(y-x)^\alpha a} = K_{D_\xi^\alpha a}$$

die mit partieller Integration bzgl. ξ direkt aus der Definition von K_a folgt.

- Die Adjungiertenformel folgt aus der Formel für das Symbol (vertausche x, y) und die Kompositionsformel, indem man bei $P \circ Q$ zunächst Q mittels eines Rechtssymbols (abhängig von y und ξ) schreibt.
- Damit die Komposition zweier Ψ DOs definiert ist, muss man annehmen, dass mindestens einer eigentlich getragen ist. Auf die Kompositionsformel für die Symbole hat dies keine Auswirkung.

Varianten, Ausblick

Wir haben den lokalen Ψ DO-Kalkül behandelt. Er erlaubt es, lokale Aussagen zu machen, z.B. über die Regularität von Lösungen partieller Differentialgleichungen. Oft möchte man aber weitergehende Informationen. Beispiele:

- Betrachtet man eine PDG auf \mathbb{R}^n , möchte man das Verhalten der Lösungen für $x \rightarrow \infty$ untersuchen.
- Betrachtet man eine PDG auf einem Gebiet, möchte man das Verhalten der Lösungen am Rand verstehen.
- Betrachtet man eine PDG auf einer Mannigfaltigkeit mit Singularitäten (z.B. einer Kegelfläche), möchte man das Verhalten der Lösungen bei Annäherung an die Singularitäten (die Kegelspitze) verstehen.

- Eine Kombination der beiden vorangehenden Punkte ist die Untersuchung der Lösungen nahe singulären Punkten des Randes eines Gebiets.

Für zahlreiche dieser Problemstellungen sind Erweiterungen des Pseudodifferentialkalküls gefunden worden (z.B. der sogenannte b -Kalkül von R. Melrose), aber eine allgemeine Theorie, die z.B. auf breite Klassen von Singularitäten anwendbar wäre, gibt es bisher nicht. Daran wird gearbeitet.

Der gleichmäßige Ψ DO-Kalkül auf \mathbb{R}^n

Der gleichmäßige Ψ DO-Kalkül auf \mathbb{R}^n ist eines der einfachsten Beispiele eines globalen Kalküls. Es ist eine gute Übung, die Einzelheiten der Theorie für $\Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$ (siehe Definition 51) durchzuführen und dabei darauf zu achten, welche Verbesserungen durch die gleichmäßige Beschränktheit erreicht werden. Hier ist eine Anleitung. Ergänzen Sie die Details.

1. $P \in \Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$ bildet $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C_b^\infty(\mathbb{R}^n)$ ab. Warum kann man als Definitionsbereich hier den Schwartz-Raum \mathcal{S} statt C_0^∞ schreiben, aber \mathcal{S} nicht durch C_b^∞ ersetzen?
2. Bei Proposition 22 ist Vorsicht geboten, da aus $a \in S_b^m$ nicht $(y-x)^\alpha a \in S_b^m$ folgt, weil die Funktion $(y-x)^\alpha$ unbeschränkt ist. Die Gleichheit

$$(y-x)^\alpha K_a = K_{D_{\xi}^\alpha a} \quad (51)$$

stimmt aber weiterhin, mit demselben Beweis.

3. Eigenschaften des Schwartz Kerns: Zusätzlich zu $\text{sing supp } K_a \subset \text{Diag}_{\mathbb{R}^n}$ folgt aus (51) für $a \in S_b^m$: Für alle α und alle N gibt es $C_{N,\alpha}$, so dass für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$ mit $|x-y| > 1$ gilt

$$|D_{x,y}^\alpha K(x,y)| \leq C_{N,\alpha} |x-y|^{-N} \quad (52)$$

(Der Kern ist schnell abfallend weg von der Diagonale.)

4. Restterme: Ist K glatt und erfüllt (52), so gibt es $p \in S_b^{-\infty}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ mit $K = K_p$. Hierbei ist $p = p(x, \xi)$ zu verstehen.³¹
5. Mit Hilfe von 3. und 4. lässt sich die Abbildungseigenschaft in 1. zu

$$P : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \quad (53)$$

(und dann mit Dualität $P : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$) verbessern.³²

6. Komposition: Aus 5. folgt insbesondere, dass $P \circ Q$ für $P \in \Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$, $Q \in \Psi_b^l(\mathbb{R}^n)$ definiert ist, ohne Annahme an die Träger. Es gilt $P \circ Q \in \Psi_b^{m+l}(\mathbb{R}^n)$.
7. Symbol eines Ψ DO: Aus 4. folgt auch, dass jeder $P \in \Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$ ein 'exaktes' Symbol hat. D.h. es gibt $p \in S_b^m(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ mit $P = P_p$, ohne Fehlerterm in $\Psi^{-\infty}$. p ist durch P eindeutig bestimmt.
8. Parametrixkonstruktion: Zunächst ist Vorsicht geboten: Das Inverse eines elliptischen Symbols in $S_b^m(\mathbb{R}^n)$ muss nicht in $S_b^{-m}(\mathbb{R}^n)$ sein, wie das Beispiel $p(x, \xi) = x$ auf $\mathbb{R}^n = (0, 1) \subset \mathbb{R}$ zeigt. Man nennt $P \in \Psi_b^m(\mathbb{R}^n)$ **gleichmäßig elliptisch**, wenn sein Hauptsymbol ein Inverses in $S_b^{-m}(\mathbb{R}^n)$ hat. Unter dieser Bedingung existiert eine Parametrix in $\Psi_b^{-m}(\mathbb{R}^n)$.

³¹Diese Aussage hat keine Entsprechung in der lokalen Theorie. p muss $K(x, y) = \check{p}(x, x-y)$ erfüllen, mittels Substitution $z = x-y$ und Fourier-Transformation also $p(x, \xi) = \int e^{-iz\xi} K(x, x-z) dz$. Aus (52) und Glattheit von K folgt $p \in S_b^{-\infty}$. In der lokalen Theorie hat man keine Information wie (52), daher wird dieses Integral divergieren, und wir finden nur $K = K_a$ für eine Amplitude $a(x, y, \xi)$, siehe den Beweis von Satz 26.

³²Es ist $x^\beta P u \in C_b^\infty(\mathbb{R}^n)$ für $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ und beliebiges β zu zeigen. Schreibe $P = P_a$ und zerlege $a = a' + a''$, wobei a' , a'' Träger in $|x-y| \leq 2$ bzw. $|x-y| \geq 1$ haben. Um $P_{a'}$ zu behandeln, schreibe $x^\beta = ((y-x) + y)^\beta$, multipliziere aus und verwende, dass $(y-x)^\gamma a' \in S_b^m$ ist für alle γ . Der Schwartz Kern von $P_{a''}$ ist glatt und erfüllt (52). Verwende dies, um $P_{a''} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ zu zeigen.